

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS

FACULTAD DE CIENCIAS

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA



TESINA

**FACTORES DETERMINANTES QUE INCIDEN EN EL ABORTO Y LAS
CONSECUENCIAS EN LA SALUD DE LAS ADOLESCENTES QUE ASISTEN
AL CENTRO DE SALUD METROPOLITANO I - 3 ILAVE-2021**

PRESENTADO POR:

FLORA IQUISE FLORES

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:

BACHILLER EN ENFERMERÍA

PUNO – PERÚ

2022

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS

FACULTAD DE CIENCIAS

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

TESINA

**FACTORES DETERMINANTES QUE INCIDEN EN EL ABORTO Y LAS
CONSECUENCIAS EN LA SALUD DE LAS ADOLESCENTES QUE ASISTEN
AL CENTRO DE SALUD METROPOLITANO I - 3 ILAVE-2021**

PRESENTADO POR:

FLORA IQUISE FLORES

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:

BACHILLER EN ENFERMERÍA

APROBADA POR EL SIGUIENTE JURADO:

PRESIDENTE

:


Dr. DAVID MOISES CALIZAYA ZEVALLOS

PRIMER MIEMBRO

:


Lic. MARITZA KARINA HERRERA PEREIRA

ASESOR DE TESIS

:


Dr. HEBER NEHEMIAS CHUI BETANCUR

Área: Ciencias Médicas y de Salud.

Disciplina: Ciencias Socio Biomédicas.

Especialidad: Enfermería en Salud Sexual y Reproductiva.

Puno, 27 de enero de 2022.

DEDICATORIA

A DIOS

A Dios por guiar mi camino, cuidarme, brindarme salud y darme fortaleza para seguir adelante. Por permitir el haber llegado a este momento tan importante de mi formación profesional.

A MI QUERIDA FAMILIA

A mi familia por el apoyo incondicional moral y económico que me brindaron. Por ser el pilar más importante por confiar en mí y ser mi motivo de perseverancia para el logro de mis metas, por los ejemplos de perseverancia que lo caracterizan y que me ha infundado siempre, por el valor mostrado para salir adelante y por el apoyo para poder continuar mi carrera con éxito.

FLORA.

AGRADECIMIENTOS

- A la Universidad Privada San Carlos de la ciudad de Puno, por darme la oportunidad de cursar estudios superiores durante los cinco años que ha durado mi formación profesional.
- A la Escuela Profesional de Enfermería y a todos mis docentes, que fueron los profesionales que inculcaron en mi, saberes propios de la carrera acompañada de valores ético morales que me permitirá ser una profesional de éxito al servicio de la salud de las personas.
- A los miembros del jurado calificador; M.Sc. Giovana FLORES ORTEGA y la Lic. Maritza Karina HERRERA PEREIRA por su valioso tiempo que me brindaron para poder guiar mi trabajo de investigación y hacer realidad su culminación.
- A mi asesor de tesina al Dr. Heber Nehemias CHUI BETANCUR, quien con su amplia experiencia en el campo de investigación ha permitido dosificar la presente investigación con temas relevantes en el planteamiento de la investigación que harán que se vuelva interesante en favor de la comunidad científica.
- Así también, quiero mostrar mi gratitud infinita a los profesionales que laboran en el Centro de Salud Metropolitano de la Ciudad de Ilave y a todas las personas que me brindaron su tiempo y colaboración en la implementación de la presente investigación el cual me conducirá a la obtención del grado académico de bachiller en Enfermería.

FLORA.

ÍNDICE GENERAL

	Pág.
DEDICATORIA	i
AGRADECIMIENTOS	ii
ÍNDICE GENERAL	iii
ÍNDICE DE TABLAS	v
ÍNDICE DE FIGURAS	vi
INDICE DE ANEXOS	vii
RESUMEN	viii
ABSTRACT	ix
INTRODUCCIÓN	1

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	3
1.1.1 . FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	5
1.2. ANTECEDENTES	5
1.2.1. ANTECEDENTES INTERNACIONAL	5
1.2.2. ANTECEDENTES NACIONAL	7
1.2.3. ANTECEDENTES LOCAL	8
1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	9
1.3.1 OBJETIVO GENERAL	9
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	9

CAPÍTULO II**MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN**

2.1. MARCO TEÓRICO	10
2.2. MARCO CONCEPTUAL	21
2.3. HIPÓTESIS	22
2.3.1. HIPÓTESIS GENERAL	22
2.3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA	22

CAPÍTULO III**METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN**

3.1. ZONA DE ESTUDIO	23
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA	24
3.2.1. POBLACIÓN	24
3.2.2. MUESTRA	24
3.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS	26

CAPÍTULO IV**EXPOSICION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS**

4.1. ASPECTOS GENERALES	29
CONCLUSIONES	36
RECOMENDACIONES	38
BIBLIOGRAFÍA	39
ANEXOS	44

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
Tabla 01: El aborto	29
Tabla 02: Factores que determinan el aborto (factores sociales y factores personales)	31
Tabla 03: Consecuencias en la salud de la madre adolescente por practicarse el aborto	33

ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
Figura 01: El aborto	57
Figura 02: Factores que determinan el aborto (factores sociales y factores personales)	57
Figura 03: Consecuencias en la salud de la madre adolescente por practicarse el aborto	58

INDICE DE ANEXOS

	Pág.
Anexo 01: Matriz de consistencia	45
Anexo 02: Guía para la validación del instrumento por juicio de experto	46
Anexo 03: Matriz para la validación del instrumento	47
Anexo 04: Cuestionario aplicado	48
Anexo 05: Formulario del consentimiento informado	50
Anexo 06: Declaración del consentimiento informado	51
Anexo 07: Solicitud para autorización de la ejecución del proyecto de investigación	52
Anexo 08: Documento que otorga el permiso para la ejecución del proyecto de investigación	53
Anexo 09: Imágenes fotográficas que evidencian el trabajo de campo	54
Anexo 10: Figuras de los resultados obtenidos	57

RESUMEN

El presente trabajo de investigación que lleva por título: “Factores determinantes que inciden en el aborto y las consecuencias en la salud de las adolescentes que asisten al Centro de Salud Metropolitano I - 3 llave - 2021”, cuyo objetivo fue conocer los factores determinantes que inciden en el aborto y las consecuencias en la salud de las adolescentes que asisten al Centro de Salud Metropolitano I - 3. La metodología aplicada al estudio fue de tipo descriptivo simple con enfoque cuantitativo, bajo el método empírico apoyado bajo el criterio de la prueba piloto, la muestra de estudio estuvo conformada por 20 adolescentes que se han sometido al procedimiento de aborto en la ciudad de llave, a quienes se les entrevistó sobre los factores que determinaron para someterse al un aborto y las consecuencias en su salud, se puso bajo su consideración la resolución del cuestionario, el instrumento para la recolección de la información fue el cuestionario aplicado a los adolescentes sometidos a estudio el cual consta de 16 preguntas que cubrirán las diferentes dimensiones de estudio. Así mismo se concluye que los factores que inciden para que una adolescente se someta a un procedimiento de aborto son los factores sociales y personales, pero el factor que mas a resaltado es el factor social es así que se tiene al 75% (15 adolescentes) quienes dijeron que se sometieron al aborto por el que diran sus amigos y su familiares es decir por miedo a las criticas que puedan recibir dentro de su entorno social, y la mayor consecuencias en la salud que se tuvo en la madre adolescente sometida a un aborto fue el sangrado vaginal así lo manifestaron el 100% (20 adolescentes) ya que por esos síntomas acudian al Centro de Salud Metropolitano de la ciudad de llave.

Palabras clave: Aborto, adolescente, centro de salud, consecuencias en la salud.

ABSTRACT

The present research work entitled: "Determining factors that affect abortion and the consequences on the health of adolescents who attend the Metropolitan Health Center I - 3 llave - 2021", whose objective was know the determining factors that affect abortion and the consequences on the health of adolescents who attend the Metropolitan Health Center I - 3. The methodology applied to the study was of a simple descriptive type with a quantitative approach, under the empirical method supported under the criteria of the pilot test, the study sample consisted of 20 adolescents who have undergone the abortion procedure in the city of llave, who were interviewed about the factors that determined to undergo an abortion and the consequences on their health, the resolution of the questionnaire was put under their consideration, the instrument for the collection of information was the questionnaire applied do to the adolescents subjected to study which consists of 16 questions that will cover the different dimensions of the study. Likewise, it is concluded that the factors that influence an adolescent to undergo an abortion procedure are social and personal factors, but the factor that has been highlighted the most is the social factor is so that it is 75% (15 adolescents) who said that they underwent the abortion for which their friends and family would say, that is, for fear of the criticism they may receive within their social environment, and the greater health consequences that were had in the adolescent mother subjected to an abortion It was vaginal bleeding that was manifested by 100% (20 adolescents) since for these symptoms they went to the Metropolitan Health Center of the city of llave.

Keywords: Abortion, adolescent, health center, health consequences.

INTRODUCCIÓN

El proyecto de investigación que se propone surge como una necesidad de conocer cuales son los factores determinantes que inciden en el aborto en las madres adolescentes en la ciudad de llave el cual es y sera una muestra para poder diagnosticar situaciones similares que puedan ocurrir en otras localidades de diferentes regiones del pais, ya que actualmente el aborto se ha constituido en un problema de salud pública que va incrementandose de forma alarmante, mas que todo en países de desarrollo por consecuentemente mientras esta problemática no sea tratada con la debida importancia veremos como se ira incremento las muertes a nivel materno, por lo tanto el presente trabajo de investigación se justifica en el hecho que permitira tener acceso a la informacion de primera mano por que las madres adolescentes vienen practicandose abortos. (1)

Cada uno de los resultados que se obtengan en el presente trabajo iran a contribuir en el aspecto de la estadística y el dogma para el profesional del Centro de Salud Metropolitano I - 3 de la localidad de llave, porque permitira extraer informacion basica sobre las peculiaridades que se producen en los abortos de madres adolescentes, y esto con la finalidad de evitar futuras muertes maternas, que tambien viene hacer un problema muy grande por la que viene atravesando nuestra sociedad; tambien la investigación va a permitir al mismo tiempo proporsionar medidas preventivas sobre embarazos no deseados y lo peligroso que resulta someterse a una aborto. Y por último los resultados de la investigación va a permitir que otros investigadores de esta línea y especialidad puedan considerarla como antecedentes en investigaciones futuras.

El presente trabajo de investigación titulado “Factores determinantes que inciden en el aborto y las consecuencias en la salud de las adolescentes que asisten al Centro de Salud Metropolitano I - 3 llave - 2021”, está integrado por cuatro capítulos; en el Capítulo

I se desarrolla el planteamiento del problema, así como también los objetivos a lo que deseamos arribar, luego se desarrollará un análisis de los antecedentes de la presente investigación, más que todo en trabajos de nivel universitario. En el Capítulo II se pone en consideración el marco teórico y el marco conceptual con temas debidamente seleccionados e individualizados. En el Capítulo III, de la tesis se plantean los procesos metodológicos, técnicos e instrumentales para la recolección de datos y su tratamiento estadístico; y, en el Capítulo IV se exponen los resultados obtenidos en la presente investigación, en consecuencia toda la información que data en la tesis está debidamente contrastada. Por último se procede a dar las conclusiones a las cuales se arribó al culminar la presente investigación, además presentamos la bibliografía y los anexos que completan nuestro estudio.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El gran inconveniente que se tiene hoy en día es la mortalidad infantil a consecuencia de un embarazo no deseado y el sometimiento a aborto; y esta es una razón realmente preocupante que obedece a la conducta de la adolescente y su pareja. Para muestra un botón, a nivel mundial, cerca de tres millones de adolescentes entre 15 a 18 años se someten de forma voluntaria a abortos que por lo general se los practican en clínicas clandestinas arriesgando así su propia vida. Por lo tanto la Organización Panamericana de la Salud ha considerado que la tasa de abortos practicados por madres adolescentes hasta el año 2020, se ha ido incrementando ya que del total analizado líneas arriba se tiene que el 11% de adolescentes se somete a aborto sin medir las consecuencias para su salud. (2)

Por otro lado la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2020, informo que que se han registrado en el mundo cerca de 22 millones de abortos inseguros, trayendo como consecuencia la muerte de la madre adolescente por el sometimiento a los llamados abortos peligrosos por lo tanto esta situación vienen representando al 13% de todas los fallecimientos de gestantes, así mismo cabe resaltar que 5 millones de mujeres

ingresaron a los hospitales, centros de salud a consecuencia de haber sido sometidos a abortos peligrosos y 3 millones de mujeres adolescentes sufrieron complicaciones y no recibieron atención médica. (3)

Básicamente en nuestro país se dice que cada cien adolescentes entre las edades de quince a diecinueve se han convertido en mamás o por lo menos quedaron embarazadas de su primer niño; muchas de estas madres adolescentes considerando de forma abierta someterse a un procedimiento de aborto y estas representan el 10,6% de toda la población adolescente. (4)

Por otro lado la Dirección Regional De Salud (DIRESA) de la Región Puno ha informado que en el año 2020, se ha registrado 1156 embarazos en adolescentes; cabe mencionar dentro de los primeros tres meses del año en nuestra región la tasa de ha incrementado de una forma peligrosa es decir en un 3% por cada mes en mujeres adolescentes cuyas edades oscilan entre quince, dieciseis y diecisiete años, es menester también mencionar que en la provincia de San Roman se ha registrado veintiocho casos de embarazos adolescentes, lo sigue la ciudad de Puno con 20 menores que quedaron embarazadas, por lo tanto la Dirección Regional de Salud ha puesto de conocimiento que en los hospitales de Juliaca, Puno e Ilay se han registrado una mayor afluencia de embarazos, partos y abortos mal practicados en adolescentes, tomando en consideración esta situación podemos afirmar que las cifras mostradas son realmente alarmantes ya que la persona perjudicada siempre será esa madre adolescente. (4)

Cabe resaltar que durante las prácticas pre profesionales que realice en el Centro de Salud Metropolitano I - 3 de la ciudad de Ilay pude observar el ingreso continuo de adolescentes al servicio de Gineco - Obstetricia, y la mayoría de estas pacientes registraban hemorragia vaginal, porque habían sido sometidas a un aborto incompleto. He notado asimismo el ingreso de adolescentes que venían atravesando su embarazo

por las 24 semanas, las mismas que presentaban una hemorragia vaginal y no se sentía los latidos fetales de su hijo y esto se debía que se habían sometido a un autoaborto porque manifestaban que era un embarazo no deseado. Por lo tanto, considerando la vulnerabilidad de las madres adolescentes por el factor de un embarazo no deseado; se hace necesario la intervención del aborto en las adolescentes como una alternativa de solución a su problema, el cual le traera serias complicaciones en su salud en el futuro de la adolescente.

Por todo lo analizado planteamos la presente investigación.

1.1.1 . FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.1.1.1. Problema general

¿Cuáles son los factores determinantes que influyen en el aborto y sus consecuencias en la salud de las adolescentes que asisten al Centro de Salud Metropolitano I - 3 llave en el año 2021?

1.1.1.2. Problemas específicos

- ¿Cuáles son los factores determinantes de índole social y personal que influyen en el aborto en las adolescentes que asisten al Centro de Salud Metropolitano I - 3 llave en el año 2021?

- ¿Cuáles son las consecuencias en la salud producidas por el aborto en las adolescentes que asisten al Centro de Salud Metropolitano I - 3 llave en el año 2021 producto del aborto?

1.2. ANTECEDENTES

1.2.1. ANTECEDENTES INTERNACIONAL

En la investigación realizada cuyo título es: **“FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A**

EMBARAZADAS ADOLESCENTES - 2018"; se llegó a la concluir que se presenta diferentes factores de riesgo a en el proceso de embarazo de las adolescentes, llevandolo a ser sometida a un aborto no onsiderando para ello las consecuencia en su salud, asimismo se pudo evidenciar que los factores personas asi como los factores sociales inciden en la practica de aborto mas que todo en las adolescentes de un nivel economico bajo. Asi mismo se ha podido evidenciar que las adolescentes no temen al riesgo que ocasiona el hecho de ser sometidas a aborto peligrosos e incompletos. (5)

En la investigación realizada en Guatemala, se pudo arribar a las siguientes conclusiones: Que el 57,3% de las mujeres entre 15 a 49 años de edad que han tenido hijos, han procreado a su primer hijo en edad adolescente, vale decir en edades entre 10 a 19 años respectivamente. Por otro lado las madres adolescentes que habitan en el sector rural en una situación de pobreza, vienen encontrándose en una situación de mayor vulnerabilidad. (6)

En la investigación realizada en Guatemala, se arribó a las siguientes conclusiones: del total de pacientes adolescentes embarazadas, el 97% eran residentes del departamento de Guatemala y mientras que el 3% se ha considerado como una situación sobrante. El 38% de madres adolescentes se a sometido a un tipo de aborto. Asi mismo el aborto incompleto fue el que reporto mas indice en la practica por parte de las madres adolescentes en un (88%), mientras que el 80.25% de los abortos ha ocurrido durante el primer trimestre de gestacion; asi mismo el tratamiento más utilizado fue el AMEU con un total de (98.8%) madres adolescentes; en consecuencia se tiene a seis pacientes madres adolescentes sometidas a aborto presentaron alguna complicación y la que más frecuentemente anomalia que presentaron estas madres adolescentes fue la hemorragia. (7)

1.2.2. ANTECEDENTES NACIONAL

Por otro lado en la investigación que se realizó en la ciudad de Lima, donde se ha llegado a las siguientes conclusiones: Que la incidencia de las pacientes que presentaron aborto más frecuente fue dentro de las edades de 21 a 29 años el cual representa al 64.9%, estas adolescentes presentaron un grado de instrucción de secundaria el cual representa al 77.37%, así mismo las adolescentes que se sometieron a este estudio eran amas de casa el cual representa al 41.95%, las pacientes adolescentes que dijeron no someterse a un aborto representó el 52%. (8)

En el estudio realizado en la ciudad de Trujillo, donde se llegó a la conclusión que en el aborto incompleto predominó en la adolescencia tardía es decir en las edades de 17 a 19 años, así mismo se observó que las madres adolescentes sometidas a aborto tenían entre 8 a 9 semanas de gestación como se puede dar una situación compleja en la salud de la menor se procede a ser transferidas a los hospitales con mayor equipamiento y profesionales capacitados para estos temas, la mayoría de estas madres nunca registraron un control prenatal, también se ha podido ver todas las adolescentes embarazadas vienen presentando problemas de anemia, infecciones urinarias, perforación en el útero, entre otras anomalías en su salud. (9)

En el estudio realizado en la ciudad de Piura, se llegó a las siguientes conclusiones; se tiene la incidencia del 18.49%; quienes se sometieron a abortos y las edades de las pacientes eran de 17 a 20 años, así mismo se presentaron pacientes con grado de instrucción de secundaria en un 56,4%, cabe resaltar que estas madres sometidas a aborto eran de procedencia de la zona urbana marginal el cual asciende al 60.7%; sobre el aborto a las que se sometieron las adolescentes fue el aborto espontáneo ya que así lo demuestra el 99.3% de adolescentes sometidas a estudio, así mismo el procedimiento clínico predominó en esta práctica abortiva incompleta así lo demuestra el 85.7%; la complicación en la salud de la madre adolescente sometida a aborto fue dolor abdominal

en un 51.4%, y por ende el tratamiento impartido fue el legrado uterino a un 59.3% de pacientes que lo requerian. (10)

Por otro lado en la investigación realizada en la ciudad de Iquitos, donde se llegó a las siguientes conclusiones del total de madres adolescentes se sometieron al aborto entre la edad de 17 a 19 años que representa el 68.6%, de todas las madres sometidas a aborto eran madres solteras el cual representa al 88.2%, y que de todas ellas vienen de la zona urbanomarginal en un 42.2% y de la zona urbana en un 37.3%, en la mayoría con grado de instrucción de secundaria en un 67.6%. La principal sintomatología de los casos de aborto son sangrado así lo manifestaron el 100% y dolor en la región de hipogastrio el cual asciende al 95.1%, así mismo de las pacientes sometidas a estudio se tuvo al 45.1% presentaron el orificio externo abierto y en el 54.9% no se produjo registro alguno. De todos los abortos presentados el 68.6% fueron catalogados como abortos espontáneos, mientras que el 25.6% se sometieron al aborto inducido y el 5.9% fueron sometidas al aborto séptico. Por otro lado cabe resaltar que los abortos espontáneos se presentaron en adolescentes de 17 a 19 años de edad que representa el 81.4%, todas ellas madres solteras que son el 85.7% de la muestra analizada. (11)

1.2.3. ANTECEDENTES LOCAL

Así mismo en la investigación realizada en la ciudad de Juliaca, donde se llegó a la siguiente conclusión: Que el 53.9% de las madres adolescentes habían sido sometidas a un aborto de tipo inducido así lo representa el 22.7%, en razón de la aceptación 43.0% de los estudiantes presenta una actitud de aceptación hacia el aborto inducido y mientras que el 21.9% han presentado una actitud de rechazo hacia el aborto inducido, encontrándose correlación y significativa entre las variables de estudio ($\text{sig}=.000$). Por lo tanto podemos decir que el conocimiento sobre el aborto se manifiesta con la mayor

actitud de rechazo hacia el aborto inducido y mientras más bajo es el nivel de conocimientos mayor actitud de aceptación hacia el aborto inducido. (12)

Por otro lado en el trabajo desarrollado en la ciudad de Puno, se llegó a concluir que: las adolescentes que han sido sometidas al estudio el 40.18% tiene la edad de dieciocho años, así mismo el 18.75% dijeron tener la edad de diecisiete años, mientras que el 12.05% ha manifestado tener la edad de dieciseis años, también el 11.61% ha manifestado que tiene la edad de quince años; en consecuencia se logro determinar que el 4.91% se han sometido a un aborto y que el 3.13% ya se habian convertido en madres adolescentes producto de un embarazo no planificado y no deseado. Por lo tanto uno de los factores que se asocian al aborto en adolescentes en edades de 11 a 18 años que acuden al hospital de Santa Rosa, obedece al grado de instruccion, al factor social y al factor persona. (13)

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Identificar cuáles son los factores determinantes que influyen en el aborto y sus consecuencias en la salud de las adolescentes que asisten al Centro de Salud Metropolitano I - 3 llave en el año 2021.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar cuales son los factores determinantes de índole social y personal que influyen en el aborto en las adolescentes que asisten al Centro de Salud Metropolitano I - 3 llave en el año 2021.
- Establecer cuáles son las consecuencias en la salud de las adolescentes que asisten al Centro de Salud Metropolitano I - 3 llave en el año 2021 producto del aborto.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. MARCO TEÓRICO

2.1.1. La adolescencia

La Organización Mundial de la Salud, considera a la adolescencia como el desarrollo de la persona humana y se produce desde la edad de 10 años hasta los 19 años, considerada edad de transición muy importante en la persona en ambos sexos, en esta etapa se producen cambios acelerados en el aspecto físico tanto del varón como en la mujer, en razón de talla, volumen corporal, aspecto físico entre otros aspectos. (14)

Por otra parte el Ministerio de Salud, considera a la adolescencia como aquella población nacional que va desde los 12 años hasta antes de que la persona cumpla los 18 años, donde existen cambios físicos así como también psicológicos. (15)

2.1.2. Etapas de la adolescencia

a. La etapa de la adolescencia temprana

Está comprendida básicamente en la edad de las personas que van desde los 12 a los 14 años respectivamente, los aspectos importantes a tener en cuenta son los siguientes:

- Se presenta la existencia de mayor recelo y menos interés por lo que piensan los padres, aquí el adolescente presenta un hueco emocional que lo conduce a tener un humor variable.

- Aquí la persona se fija y se preocupa por su aspecto físico, aparecen las inseguridades con el mismo sobre su apariencia física y le da valor a temas de sexualidad y la forma de iniciarse.
- Tiende a relacionarse de forma rápida con el sexo opuesto así como con las personas.
- Su persona y su desarrollo social se va a desenvolver en base a impulsos y con razonamientos abstractos. (16)

b. La etapa de la adolescencia intermedia

En esta etapa están comprendidas las personas cuya edad van desde los 15 años hasta los 17 años, y se tiene las siguientes peculiaridades:

- El adolescente tiene mayor problemas con los padres ya que se presentan opiniones contrarias entre el adolescente y su progenitor, se acepta con su aspecto físico.
- El adolescente se integra a dentro de la sociedad y círculo de amigos con mayor intensidad, acepta moda y reglas de extraños, consecuentemente es fácil de que pueda integrar una pandilla.
- Desarrolla una mayor creatividad, genera el pensamiento supremo, y considera situaciones arriesgadas para su integridad física que lo acepta incluso realizarlo. (17)

c. La etapa de la adolescencia tardía

Comprendida desde los 18 años hasta los 21 años, y comprende las siguientes situaciones peculiares como son:

- En esta etapa el adolescente genera el apego hacia los padres reconsiderando opiniones en favor de sus progenitores.
- Ya el adolescente se fija muy poco en razón a su aspecto físico o por lo que viste y calza.
- Empieza a relacionarse con personas mayores y acepta las críticas, genera una mayor cultura y tolerancia a los demás.

- En esta etapa desarrolla sus valores morales con objetividad y adquiere compromisos serios, genera su vocación hacia la religión. (18)

2.1.3. El embarazo adolescente

Es llamado como embarazo precoz, la mujer se embaraza desde la etapa inicial de la adolescencia o en la pubertad, o en la etapa final de la adolescencia.

Este embarazo se produce básicamente en las mujeres que no han alcanzado la mayoría de edad y por situaciones económicas dependen de sus padres al interior de sus familias.

Estos tipos de embarazos por lo general siempre se conducen al aborto porque no fueron planificado y en su defecto se consideran embarazos no deseados. (19)

2.1.4. Factores del embarazo en la adolescencia

Varios son los factores que determinan estos embarazos en adolescentes, pero el más importante es la falta de educación sexual.

Los factores que enunciamos son algunas de las causas que promueven el embarazo no deseado en adolescentes, a saber:

a. Los factores personales que determinan el embarazo en adolescentes

- La adolescente no tiene una información adecuada sobre los métodos anticonceptivos.
- Falta de madurez en temas de sexualidad.
- Presenta temas para indagar y conversar sobre temas de sexualidad.
- Los progenitores no le prestan atención a los problemas que viene presentando la adolescente.
- La adolescente carece de afecto por parte de sus padres.
- Padece de una baja autoestima.
- Actúa por curiosidad sin temor a nada ni a nadie. (19)

b. Los factores sociales que determinan el embarazo en adolescentes

- El inicio de la actividad sexual de la menor en edad muy temprana.
- Permanece el mayor tiempo a solas en compañía del sexo opuesto.

- No desarrolla su etapa de esparcimiento y le resta importancia a la educación.
- Tiene muy poca información sobre educación sexual y métodos anticonceptivos..
- Deseos de sentir el hecho de ser mamá. (20)

c. Factores biológicos

La edad de menarquia es un factor determinante de la capacidad reproductiva, la que está ligada a la proporción de ciclos ovulatorios que alcanzan cerca del 50% después de dos años de la menstruación de la niña esto produce el adelanto de la edad de menarquia. Así, las adolescentes son fértiles a una edad menor.

d. Factores psicosociales y la conducta sexual de la adolescente

es la actitud que tienen la adolescente por ser atraída hacia el sexo opuesto, el cual la llevara al inicio temprano de su actividad sexual. Estos factores psicosociales van acompañados por la modernización dentro del contexto social así mismo la globalización en la venimos viviendo, por lo tanto la influencia de los padres hacia la buena práctica de los adolescentes en temas de sexualidad evitan embarazos riesgoso.

e. El factor de la conducta sexual de la adolescente

Se dice que en latinoamerica derca del 45% de adolescentes ya han iniciado su vida sexual y son personas que vienen practicando las relaciones sexuales con frecuencia y esta situacion se ahonda mas en las comunidades campesinas y en lugares donde existe pobreza y extrema pobreza.

f. La disfunción familiar como factor del embarazo adolescente

Es el mal funcionamiento familiar puede predisponer a una actividad sexual prematura, y un embarazo puede ser visto como la posibilidad de huir de un hogar donde existe permanentes conflictos entre papa y mama, o en su defecto exista problemas por infidelidad de parte de uno de los cónyuges que generan inestabilidad en el hogar.

g. Los factores psicológicos y culturales

En la adolescencia la persona no es capaz de entender todas las consecuencias de la iniciación precoz de la actividad sexual ya que prepondera el egocentrismo tras ver reflejada en la frase "eso no me va a pasar". Esto implica que el adolescente desarrolla una grado de necesidad para probar su fecundidad, estando afligidas por fantasías de infertilidad, puede ser un factor poderoso durante la adolescencia. así mismo el ambiente de vivir en una pobreza y extrema pobreza nos lleva a que los adolescentes puedan iniciarse de forma temprana en la actividad sexual, así mismo el otro lado de la moneda refleja los medios de comunicación que incitan a la iniciación sexual de los adolescente motivados por diferentes factores los cuales están libres de barreras culturales.

h. El factor de la anticoncepción y embarazo adolescente

Cabe resaltar que el 50% de los embarazos de adolescentes ocurren durante los seis meses siguientes al inicio de la actividad sexual, y el 20% en el curso del primer mes. De estos adolescentes, no más de un 30% usó algún método anticonceptivo en ese período, ya que pensaban tener todo bajo control donde conciben la idea que "eso no iba a pasarles", y que no estaba planificado. (20)

2.1.5. El aborto

El aborto es aquel procedimiento que se realiza con la finalidad de poder interrumpir el embarazo considerando para ello que el feto el cual esta en el vientre materno no tiene la capacidad biologica para poder subsistir fuera del vientre de la madre, por lo tanto este tipo de procedimiento como es el aborto esta prohibido en algunos países y en otros esta permitido. (21)

La OMS la ha considerado como una suerte de terminación del periodo de gestación, no considerando para ello la causa y por ende el feto no podría sobrevivir fuera del vientre de la madre.

En consecuencia se puede definir al aborto como una terminacion del periodo gestacional de la madre antes de que el feto nazca y pueda sobrevivir fuera del vientre de

la mujer gestante, esta interrupcion ppor lo general se realiza dentro de las veintidos semanas del proceso gestacional, es mas el feto en este momento presenta un peso que oscila entre los 500 gramosy con una talla de 20 centimetros. (22)

2.1.6. El aborto en adolescentes

El aborto en adolescentes sigue constituyendo en un grave problema de salud pública, que necesita la intervencion de diferentes entes, tanto desde el aspecto educativo, social y familiar, repaldado desde el aspecto de la salud. (23)

Segun datos desarrollados por la OMS se tiene que cada día vienen padeciendo mujeres adolescentes por complicaciones de abortos quirúrgicos o del uso de métodos médicos inseguros para la terminación del embarazo. Esta situacion se trasluce en una cifra alarmante a nivel mundial ya que se tienen cada año a 19 millones de mujeres vienen sometendose a un aborto inseguro; de estos 18,5 millones ocurren en países en vías de desarrollo. Las muertes de madres adolescentes en el mundo se viene estimando que han llegado el último año a 68000 en todo el mundo y lo peor es que esta cifra va en crecida. (23)

2.1.7. Sintomatologia del aborto en adolescentes

Cuando una adoilescente es sometida a aborto puede presentar los siguientes sintomas:

- Presentara sangrado transvaginal con o sin cólicos.
- Genera cólicos agudos abdominales.
- Presenta dolor persistente, constante o intermitente a la altura del vientre.
- Salida de material tisular en forma de coágulos por la vagina. (24)

2.1.8. Tipos de aborto a las que son sometidas las adolescentes

a. Aborto precoz

Este tipo de aborto es el que se produce antes de las doce semanas de gestación.

b. Aborto tardío

Se produce este tipo de aborto cuando el proceso de gestacion esta entre semana 12 y la semana 20. (24)

c. Amenaza de aborto

Cuando existe amenaza de aborto este se manifiesta cuando se presenta un sangrado vaginal en la adolescente durante la primera mitad del embarazo, puede acompañarse de dolor cólico espasmódico, sin modificaciones cervicales. (25)

d. Aborto incompleto

Este tipo de aborto se caracteriza por la expulsión del feto y la placenta con relacion al contenido uterino, con retención parcial o total de restos embrionarios dentro del útero de la madres adolescente. (25)

e. Aborto completo

Este tipo de aborto se manifiesta cuando se ha producido la expulsión completa del producto de la gestación, para lo cual es recomendable que la paciente se someta a una ecografia. Por lo general la paciente no presenta incomodidad ni mucho menos dolor. (26)

f. Aborto inevitable

El aborto inevitable se peculiariza porque existe la dilatacion del cérvix, y se rompe cada una de las membranas del vientre, aqui se van a presentar contracciones uterinas con dolor intenso, esperando que el feto sea expulsado en la brevedad del tiempo. (26)

g. Aborto inminente

El aborto inminente se caracteriza porque la bolsas del liquido amniótico esta integro pero existe la presencia de dilatacion, existe tambien el sangrado vaginal y el dolor en las contracciones es intenso. (27)

h. Aborto séptico

Este tipo de aborto se da cuando la madre presenta fiebre por encima de los 38 grados existe sangrado con un mal olor y se da por lo general en pacientes que tuvieron abortos recientes. (27)

i. Aborto en curso

En este tipo de aborto se presenta un sangrado abundante el cual conlleva a la paciente a tener momentos de desesperación y por lo general debe de ser evacuada a un establecimiento de salud dentro de la brevedad del tiempo corriendo el riesgo de que la madre pueda fallecer por desangramiento.

j. Aborto diferido o aborto retenido

Este tipo de aborto se caracteriza porque el embarazo se ha interrumpido, aquí no se presenta actividad cardíaca o no se visualiza el embrión, en este aborto se produce sin que haya hemorragia vaginal o dolor.

k. Aborto recurrente o de repetición

Basicamente este aborto se presenta cuando la madre ha sido sometida en las de dos oportunidades al aborto y existe una degeneración en el vientre materno.

l. Abortos provocados o inducidos

Los abortos provocados se los realizan las madres de forma voluntaria, y son sometidas por lo general a la asistencia de un profesional médico o en su defecto pueden ser practicadas por una persona sin ninguna preparación médica, la finalidad es que el feto salga del vientre materno sin vida. En consecuencia se interrumpe el proceso de desarrollo de la vida. (27)

2.1.9. Características de los factores sociales que determinan el aborto en adolescentes

Dentro de estas características de los factores sociales para que determine el aborto se tiene básicamente:

a. El abandono de la pareja y el miedo a los padres

Abandono de la pareja; es donde la pareja con la que tuvo relaciones sexuales cuando se enteró simplemente la dejó a la adolescente y que muchas veces era negado la paternidad del hijo concebido, ya que la relación de la pareja tiene un peso importante en la decisión.

Sobre el miedo a los padres; donde muchas de las adolescentes piensan que le darán una decepción más grande para sus progenitores ya que ellos esperan que la adolescente fuera toda una profesional exitosa y no ser una madre adolescente.

b. La búsqueda de apoyo de la adolescente al verse embarazada

De acuerdo al momento en que vienen atravesando las adolescentes estas siempre refieren haber buscado ese apoyo en su mayoría en amigos, la pareja y por última estancia con la familia. Por ejemplo cuando busca al amigo las expresiones son: si hable con un amigo del colegio o de la universidad él me dijo que si lo quería hacer que existía un método que él ya lo había practicado con la novia, así también las amigas les dicen me dijo que no lo podía tener y que teníamos que hacer algo; por otro lado cuando lo comentan con la pareja dicen que lo pensara, y después las expresiones pasan porque el novio que tenía en ese momento no tenía el dinero para hacerse cargo del hijo que esperaba, por otro lado cuando la familia influye se da a través de los hermanos donde siempre refieren que son muy jóvenes para tener al hijo y los retrasaría mucho en los planes que tenía y es más frustrara sus metas. (28)

2.1.10. Las incidencias de aborto incompleto

Este tipo de aborto se practican cuando la adolescente no lo ha planificado ni mucho menos lo desea porque piensa que truncara sus aspiraciones como persona, así mismo evalúa las repercusiones que tendrá cuando se lleguen a enterar sus padres por lo tanto estas circunstancias hacen de que la adolescente se someta a este tipo de aborto. El

problema del aborto en la mayoría de los casos deriva de la actividad sexual en los primeros años de la adolescencia el cual se da bajo un mínimo de cuidados y así como prevenir los riesgos que tal situación demandaría. Por lo tanto en el Perú se tiene al 30% de embarazos en un aborto incompleto, esta cifra es reflejada en 271 mil casos de cuadros clínicos de madres adolescentes que ingresaron con serias complicaciones en los últimos 3 años sobre abortos mal practicados, pero lo peor de todo se estima que esta cifra irá en crecida si no se hace algo por frenar los embarazos en las adolescentes. (29)

2.1.11. Consecuencias en la salud de la adolescente cuando se somete al aborto

a. La preeclampsia

Esta situación se presenta cuando existe hipertensión al momento momento de ser sometida la adolescente al acto propio del aborto, por lo tanto si no se toma las precauciones clínicas la madre adolescente puede llegar a convulsionar hasta incluso morir después del procedimiento de aborto.

b. Puede existir la perforación del útero

Esta situación es algo peligrosa ya que se producirá desgarros en el útero el cual si no es controlado se producirá una hemorragia que puede llevar a la muerte a la madre adolescente, estos desgarros se producen por que en la madre no ha desarrollado como debe de ser el útero, y por la introducción de instrumentos en el momento preciso del aborto y es este el principal cuadro por la que ingresan las madres al establecimiento de salud.

c. Se va a presentar hemorragias al momento de practicar el aborto

Se manifiesta mediante el sangrado vaginal que se presenta en el momento cuando se va a practicar el aborto, y esto no es bueno para la madre porque puede padecer problemas en su salud que la puede llevar a la muerte.

d. Cuando los abortos son practicados con instrumentos punzantes (como las agujas de punto)

las consecuencias serán:

- Perforación uterina
- Perforación de vejiga urinaria, recto y asas intestinales
- Desgarros del cuello del útero

Y la parte agravada de estas lesiones causadas será:

- Va a presentar peritonitis.
- Abdomen agudo.
- Hemorragias prolongadas.
- Infecciones agudas.
- Resecciones intestinales.
- Extirpaciones uterinas y esterilidad causadas por una mala praxis abortiva.
- Fístulas recto vesicales con incontinencia urinaria y fecal el cual va ir en desmedro de la paciente causándole mucho dolor.
- Muerte por shock hipovolémico o por shock séptico que es lo mas lementable que va a suceder producto del aborto inducido y mal practicado.

e. Abortos por lavados vaginales

Por otro lado se tiene otro método utilizado para poder producir el abortos cuales se dan a través de lavados vaginales con sustancias variadas, o ingieren por vía oral distintas medicaciones que complican la vida de la paciente, las consecuencias de estos métodos serán:

- Se van a producir quemaduras químicas graves localizadas con lesiones deformantes y con esterilidad.
- Va a provocar en la paciente hipertensión con riesgo a paro cardiaco.
- Va a generar un edema pulmonar y con consecuente paro cardíaco.

- Se presentan embolismos que según el vaso donde impactan generarán infartos pulmonares cardiacos o cerebrales, provocando graves secuelas y en algunos casos la muerte. (30)

2.2. MARCO CONCEPTUAL

a. Aborto

Viene hacer el acto de interrumpir el proceso gestacional, permitiendo la expulsión del feto sin la capacidad de que pueda sobrevivir fuera del vientre de la madre. (31)

b. Adolescente

Es el desarrollo de la persona que va desde la niñez hasta la juventud. (32)

c. Características

Cualidad que permite identificar las diferentes cuestiones vinculadas al temperamento de la persona desde el aspecto físico y clínico. (32)

d. Conocimiento

Es la relación que se establece entre la persona y un objeto, mediante la cual el sujeto capta mentalmente su realidad dentro del entorno social. (33)

e. Embarazo no deseado

Es el embarazo no planificado o llamado también por error donde la madre siente desprecio por la vida del feto. (34)

f. Factor personal

Es el factor que determina a la persona dentro de su comportamiento dentro de la sociedad el cual le permite tomar decisiones bajo una concepción interna de su yo

personal. (35)

g. Factores de riesgo

Se caracteriza por situaciones que pasa la persona por pretender experimentar momentos nuevos en su vida pero sin asumir las consecuencias. (35)

h. Presión del grupo

Esta presión se da por los amigos de la adolescente de insistir a desarrollar actividades en contra de su voluntad por lo general es un factor elemental en someterse al aborto por parte de la madre adolescente. (36)

2.3. HIPÓTESIS.

2.3.1. HIPÓTESIS GENERAL

Existen diversos factores determinantes que inducen el aborto y vienen causando daño en la salud de las adolescentes de 15 a 18 años que asisten al Centro de Salud Metropolitano I - 3 llave en el año 2021.

2.3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS


- Los factores sociales y personales vienen influyendo en el aborto en las adolescentes que asisten al que asisten al Centro de Salud Metropolitano I - 3 llave en el año 2021.
- Las adolescentes que asisten al Centro de Salud Metropolitano I - 3 de llave, están siendo afectadas en su salud como consecuencia del aborto practicado.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. ZONA DE ESTUDIO

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Centro de Salud Metropolitano que está Ubicado en la Provincia del Collao - Ilave en la Av. Atahualpa S/N, cuenta con los servicios de Consultorio externo, medicina general, emergencia - tóxico, consultorio materno, control gestante, consultorio de planificación familiar, control recién nacido, control niños menores de un año, consultorio crecimiento y desarrollo del niño, consultorio de psicología, consultorio de programa de inmunizaciones y consultorio de triage COVID, servicio de admisión, servicio de laboratorio y consultorio de odontología.



3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

3.2.1. POBLACIÓN

La población de estudio estuvo constituida por 40 madres adolescentes que han acudido al Centro de Salud Metropolitano de la ciudad de llave a poder recibir algun tratamiento sobre sintomas de abortos.

3.2.2. MUESTRA

Para la determinación de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:

$$n = \frac{N(Z)^2(p)(q)}{(N-1)(e)^2 + (Z)^2(p)(q)}$$

Donde:

- N: Tamaño de la población = **40**
- p : Proporción favorable para la investigación = **0,5**
- q: Proporción desfavorable para la investigación = **0,5**
- Z: Nivel de confianza (al 95%) = **1.96**
- e: Error de estimación (al 5%) = **0.05**

$$n = \frac{60(1.96)^2(0.5)(0.5)}{(60-1)(0.05)^2 + (1.96)^2(0.5)(0.5)}$$

$$n = 20$$

Quedando la muestra conformada por 20 madres quienes acuden al Centro de Salud Metropolitano de la ciudad de llave en busca de tratamiento medico sobre una situacion de aborto.

a) Criterios de inclusión:

Madres adolescentes sometidos a estudio.

b) Criterios de Exclusión:

Madres adolescentes que no quisieron someterse al estudio.

Operacionalización de variables

VARIABLE	DIMENSIÓN	INDICADOR	CATEGORÍA
Variable independiente:	- El aborto.	- Conocimiento sobre el aborto.	(Si) (No)
Factores que determinan el aborto en adolescentes.		- Conocimiento sobre las consecuencias del aborto.	(Si) (No)
Variable dependiente:	Factores que determinan el aborto.	- Factores sociales. Por influencia de los amigos. Por influencia de la familia. Por influencia de la madre adolescente.	(Si) (No) (Si) (No) (Si) (No)
Factores sociales y personales que determinan el aborto.		- Factores personales sobre el aborto. Por miedo a su familia. por influencia de la pareja.	(Si) (No) (Si) (No)
Consecuencias en la salud física de la madre adolescente.	- Problemas físicos.	- Complicaciones en la salud de la madre adolescente. - Riesgo de vida de la madre adolescente.	

Fuente: Elaboración propia.

3.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS

Método. En la elaboración del presente trabajo de investigación se ha desarrollado un estudio de tipo descriptivo simple bajo el enfoque cuantitativo.

Diseño. Para la implementación de la investigación se aplicó el diseño de investigación no experimental bajo el sistema de corte transversal, esto nos permitió hacer una descripción sobre lo hecho en una situación real al momento de realizar el recojo de datos.

M ----- O

Dónde:

M: Es la muestra en quien se realiza el estudio

O: Información relevante o de interés recogida

Técnica

Se utilizó como técnica la encuesta donde se aplicó el respectivo cuestionario, por lo tanto antes de ser aplicado a la madre adolescente se le explicó sobre el contenido de las preguntas y cual es el motivo por la que se está haciendo el desarrollo de la misma, y poner en claro el porqué debe de responderlas de forma aseverativa; también se dio el alcance sobre la obtención de la puntuación.

Instrumento

Se utilizo el cuestionario aplicando la prueba piloto para conocer los factores determinantes que influyen en el aborto y sus consecuencias en la salud de las adolescentes de 15 a 18 años que asisten al Centro de Salud Metropolitano I - 3 llave, en razón a una escala competencial, considerando para ello tres dimensiones cada

dimensión con sus respectivos indicadores y cada indicador con sus respectivas preguntas, la puntuación a las preguntas a aplicar serán las siguientes segun la variable a analizar.

- Para la dimensión El aborto.

<u>CATEGORÍA</u>	<u>PUNTAJE</u>
- Si	1
- No	0

- Para la dimensión factores que determinan el aborto de la madre adolescente.

<u>CATEGORÍA</u>	<u>PUNTAJE</u>
- Si	1
- No	0

- Para la dimensión Problemas en la salud física.

<u>CATEGORÍA</u>	<u>PUNTAJE</u>
- Si	1
- No	0

Procesamiento de los datos quitar recolectados

Para la implementación del informe del borrador de la investigación se utilizo, el plan piloto que nos permitio recoger la información de primera mano de las madres adolescentes los factores determinantes que influyen en el aborto y sus consecuencias

en la salud de las adolescentes de 15 a 18 años que asisten al Centro de Salud Metropolitano I - 3 llave contrastado para ello con el método empírico para la recolección de la información, abordando de forma directa a la persona, una vez obtenida toda la información completar se va a procesar mediante la hoja de cálculo de Microsoft Excel, para la interpretación y análisis de los datos que se presentará en tablas y gráficos respectivamente.

CAPÍTULO IV

EXPOSICIÓN ANALISIS DE RESULTADOS

4.1. ASPECTOS GENERALES

Este trabajo de investigación se ha realizado utilizando información de primera mano el cual ha comprendido abordar de forma directa al adolescente con el propósito de cuales son los factores que inciden para poder someterse a un aborto para poder evitar algún embarazo no deseado, la entrevista y el cuestionario que se aplicó fueron a mujeres adolescentes, en consecuencia se ha podido consolidar el siguiente resultado:

Tabla 01: El aborto.

El aborto	Si	f (%)	No	f (%)	Total	(%)
Se sometio a un aborto clandestino y peligroso.	6	30%	14	70%	20	100%
Tuvo informacion de las consecuencias en la salud sobre el aborto que se practico	3	15%	17	85%	20	100%

Fuente: Cuestionario aplicado.

En la tabla 01 se muestran los resultados que han sido obtenidos sobre el aborto como tema general asi mismo se ha considerado los siguientes resultados es asi que se obtuvo al 30% (6 adolescentes) han manifestado que si se sometieron a un aborto de caracter

clandestino y peligroso donde la persona que la intervino no era profesional de la salud ya que la captaron en las calles en el momento de desesperacion, mientras que el 70% (14 adolescentes) manifestaron que no se sometieron el aborto en un lugar clandestino mas por el contrario se las practicaron en lugares donde prestan atencion de salud donde atiende por lo general un profesional de la salud y es esta persona que la practico el procedimiento; asi mismo se tiene al 15% (3 adolescentes) quienes dijeron que si se informaron sobre las consecuencias en su salud que iba a causar el someterse a un aborto pero por esta apremiante situacion han preferido arriesgarse y eran conscientes del padecimiento de las mismas y esa era la razon por la que acudian al Centro de Salud Metropolitano, mientras que el 85% (17 adolescentes) dijeron que no tuvieron informacion a la mano sobre las consecuencias en la salud producto de haberse practicado el aborto y por esa razon fue que entraron en panico y asistieron al Centro de Salud en busca de ayuda medica para que no pase a mayores.

Tomando en consideracion la doctrina clinica desarrollada en la presente investigacion donde manifiesta que el aborto en adolescentes sigue constituyendo en un grave problema de salud pública, que necesita la intervencion de diferentes entes, tanto desde el aspecto educativo, social y familiar, repaldado desde el aspecto de la salud. Segun datos desarrollados por la OMS se tiene que cada día vienen padeciendo mujeres adolescentes por complicaciones de abortos quirúrgicos o del uso de métodos médicos inseguros para la terminación del embarazo. Esta situacion se trasluce en una cifra alarmante a nivel mundial ya que se tienen cada año a 19 millones de mujeres vienen sometendose a un aborto inseguro; de estos 18,5 millones ocurren en países en vías de desarrollo. Las muertes de madres adolescentes en el mundo se viene estimando que han llegado el último año a 68000 en todo el mundo y lo peor es que esta cifra va en crecida.

Por lo tanto el conocimiento sobre el aborto y sus consecuencias que puedan desarrollar

las jóvenes adolescentes es fundamental para evitar someterse a este tipo de prácticas ilegales como es la suspensión del desarrollo de una nueva vida a consecuencia de un embarazo no deseado, por lo tan urge de sobre manera motivar a las adolescentes a informarse mejor sobre este tipo de procedimientos.

Tabla 02: Factores que determinan el aborto (factores sociales y factores personales).

Factores sociales y personales	Si	f (%)	No	f (%)	Total	(%)
Aceptaría abortar por influencia de las amigas.	12	60%	8	40%	20	100%
Tiene miedo a lo que dirán sus amigos y amigas sobre su embarazo.	15	75%	5	25%	20	100%
Ha recibido influencia de sus familiares para poder abortar.	3	15%	17	85%	20	100%

Fuente: Cuestionario aplicado.

En la tabla 02 se tiene los resultados que han sido obtenidos sobre los diferentes factores que influyen o han influido en las adolescentes para poder someterse a un aborto, es así que se tiene al; 60% (12 adolescentes) quienes dijeron que abortaron por influencia de sus amigas y amigos ya que ellos mismos le recomendaron donde iba a poder practicárselo, mientras que el 40% (8 adolescentes) dijeron que no habían recibido influencia de sus amiga y amigos para someterse a un aborto; así mismo se tiene al 75% (15 adolescentes) quienes dijeron que se sometieron al aborto por el que diran sus amigos y familiares es decir por miedo a las críticas que puedan recibir, mientras que el (25% (5 adolescentes) dijeron que no influye para nada las críticas de sus amigos y familiares en la decisión que habían tomado; por otro lado se tiene al 15% (3 adolescentes) quienes manifestaron que habían recibido influencias de sus familiares para que pueda someterse

al aborto, mientras que el 85% (17 adolescentes) dijeron que no recibieron influencia de sus familiares para poder abortar.

Tomando en consideración el antecedente consignado en la presente investigación cuyo título es: **“FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A EMBARAZADAS ADOLESCENTES - 2018”**; se llegó a la conclusión que se presenta diferentes factores de riesgo a en el proceso de embarazo de las adolescentes, llevándolo a ser sometida a un aborto no considerando para ello las consecuencias en su salud, asimismo se pudo evidenciar que los factores personales así como los factores sociales inciden en la práctica de aborto más que todo en las adolescentes de un nivel económico bajo. Así mismo se ha podido evidenciar que las adolescentes no temen al riesgo que ocasiona el hecho de ser sometidas a abortos peligrosos e incompletos, cabe resaltar lo que manifiesta la doctrina sobre el tema en cuanto a los factores del embarazo en la adolescencia, el cual considera que son varios los factores que determinan estos embarazos en adolescentes, pero el más importante es la falta de educación sexual, los factores que enunciamos son algunas de las causas que promueven el embarazo no deseado en adolescentes, son: a. Los factores personales que determinan el embarazo en adolescentes, la adolescente no tiene una información adecuada sobre los métodos anticonceptivos, falta de madurez en temas de sexualidad, presenta temas para indagar y conversar sobre temas de sexualidad, los progenitores no le prestan atención a los problemas que viene presentando la adolescente, la adolescente carece de afecto por parte de sus padres, padece de una baja autoestima, actúa por curiosidad sin temor a nada ni a nadie; también tenemos a los factores sociales que determinan el embarazo en adolescentes como son: El inicio de la actividad sexual de la menor en edad muy temprana, permanece el mayor tiempo a solas en compañía del sexo opuesto, no desarrolla su etapa de esparcimiento y le resta importancia a la educación, tiene muy poca información sobre educación sexual y métodos anticonceptivos, deseos de sentir el hecho de ser mamá.

Por lo tanto considerando los manifestado líneas arriba los resultados que hemos obtenido en la tabla 02 guarda relación con lo analizado ya que el factor elemental para que una adolescente pueda someterse a una aborte es el factor social ya sea por influencia de sus amigas o amigos, o en su defecto por su mismo entorno social.

Tabla 03: Consecuencias en la salud de la madre adolescente por practicarse el aborto.

Complicaciones y riesgos en la salud	Si	f (%)	No	f (%)	Total	(%)
Tuvo complicaciones en el aborto practicado.	20	100%	0	0%	20	100%
Presentó dolor abdominal.	18	90%	2	10%	20	100%
Presentó sangrado vaginal.	20	100%	0	0%	20	100%
Presentó dolor lumbar	16	80%	4	20%	20	100%
Ha presentado fiebre alta y escalofríos	15	75%	5	25%	20	100%

Fuente: Cuestionario aplicado.

En la tabla 03 se muestran los resultados que han sido obtenidos sobre las consecuencias que se tiene en la salud de las adolescentes producto de haber sido sometidas a un aborto, es así que se tiene al 100% (20 adolescentes) dijeron si tuvieron complicaciones cuando se sometieron al procedimiento del aborto y es por eso que han acudido al Centro de Salud Metropolitano de la ciudad de Ilave a fin de buscar un chequeo medico de rutina en otros casos estaban presentando complicaciones en su salud; por otro lado el 90% (18 adolescentes) dijeron que vienen presentando dolor abdominal producto de haberse sometido a un aborto, mientras que el 10% (2 adolescentes) manifestaron que no tiene dolor abdominal; así mismo cabe mencionar que el 100% (20 adolescentes) dijeron presentar sangrado vaginal producto del aborto a la

cual se habian sometido y que no se sabia dicho sangrado por es que acudian al Centro de Salud Metropolitano; por otro lado se tiene al 80% (16 adolescentes) manifestaron presentar dolor lumbar es decir en las caderas que nos les permitia realizar sus actividades, mientras que el 20% (4 adolescentes) dijeron no presentar dolor lumbar o llamado tambien dolor de cadera; asi mismo se tiene al 75% (15 adolescentes) quienes dijeron presentar fiebre alta y escalofrios producto de haberse sometido al aborto, mientras que el 25% (5 adolescentes) dijeron no presentar ningun sintoma de fiebre ni mucho menos escalofrios despues de haberse sometido a un aborto.

Considerando el antecedente de la presente investigacion el cual obedece al estudio realizado en la ciudad de Trujillo, donde se llego a la conclusion que en el aborto incompleto predominó en la adolescencia tardía es decir en las edades de 17 a 19 años, asi mismo se observo que las madres adolescentes sometidas a aborto tenian entre 8 a 9 semanas de gestación como se puede dar una situación compleja en la salud de la menor se procede a ser transferidas a los hospitales con mayor equipamiento y profesionales capacitados para estos temas, la mayoría de estas madres nunca registraron un control prenatal, también se ha podido ver todas las adolescentes embarazadas vienen presentando problemas de anemia, infecciones urinarias, perforación en el útero, entre otras anomalías en su salud, asi mismo considerando al estudio que se tiene en el antecedente de caracter nacional el cual se ha llevado en la ciudad de Piura, se llego a las siguientes conclusiones; se tiene la incidencia del 18.49%; quienes se sometieron a abortos y las edades de las pacientes eran de 17 a 20 años, asi mismo se presentaron pacientes con grado de instruccion de secundaria en un 56,4%, cabe resaltar que estas madres sometidas a aborto eran de procedencia de la zona urbana marginal el cual asciende al 60.7%; sobre el aborto a las que se sometieron las adolescentes fue el aborto espontaneo ya que asi lo demuestra el 99.3% de adolescentes sometidas a estudio, asi mismo el procedimiento clinico a predominado en esta practica

abortiva incompleta así lo demuestra el 85.7%; la complicación en la salud de la madre adolescente sometida a aborto fue dolor abdominal en un 51.4%, y por ende el tratamiento impartido fue el legrado uterino a un 59.3% de pacientes que lo requerían. Por otro lado cabe resaltar la sintomatología del aborto en adolescentes, es decir cuando una adolescente es sometida a aborto puede presentar los siguientes síntomas: Presentará sangrado transvaginal con o sin cólicos, genera cólicos agudos abdominales, presenta dolor persistente, constante o intermitente a la altura del vientre, salida de material tisular en forma de coágulos por la vagina.

Por lo tanto las consecuencias en la salud para una madre adolescente que se ha sometido aun procedimiento ilegal de aborto se manifiesta de forma inmediata con sangrado vaginal, con dolores en el abdomen, con fiebre alta y escalofríos, el cual se observa en la evolución de la paciente sometida al aborto, por lo tanto nuestro resultado obtenido en la tabla 03 guarda relación con los resultados obtenidos en los antecedentes citados así como en la doctrina clínica especializada.

CONCLUSIONES

PRIMERA: Al culminar la presente investigación se ha observado que todas las encuestadas madres adolescentes se practicaron el procedimiento del aborto pero cabe resaltar que los factores que incidieron para la práctica abortiva fueron factor persona y el factor social, pero el que más ha inducido al aborto en estas adolescentes fue el factor social es así que se al 75% (15 adolescentes) quienes dijeron que se sometieron al aborto por el que dirán sus amigos y amigas es decir por miedo a las críticas que puedan recibir dentro de su entorno social, por otro lado cabe manifestar que las consecuencias en la salud para la madre adolescente sometida a un aborto es notorio pero de todas las consecuencias en su salud que presentan es el dolor abdominal así lo manifestaron el 90% (18 adolescentes), otra consecuencia es el sangrado vaginal así lo manifestaron el 100% (20 adolescentes) ya que por esos síntomas acudían al Centro de Salud Metropolitano de la ciudad de Ilave..

SEGUNDA: El factor más determinante que indujo a la madre adolescente a someterse a un aborto es el factor social ya que se se tiene al 60% (12 adolescentes) quienes dijeron que abortaron por influencia de sus amigas y amigos ya que

ellos mismos le recomendaron donde iba a poder practicarlo sin importar sus consecuencias y la confiabilidad de la persona que iba a a practicar dicho procedimiento.

TERCERA: Sin duda alguna el procedimiento de aborto ha tenido consecuencias en la salud para la madre adolescente que se ha llegado a someter a este tratamiento de interrupcion de una vida humana, es asi que se tiene al 100% (20 adolescentes) dijeron presentar sangrado vaginal producto del aborto a la cual se habian sometido y que no sesaba dicho sangrado por es que acudian al Centro de Salud Metropolitano, asi mismo se tiene al 90% (18 adolescentes) dijeron que vienen presentando dolor abdominal producto de haberse sometido al aborto y que el dolor era muy intenso.

RECOMENDACIONES

- Al personal asistencial del Centro de Salud Metropolitano de la ciudad de Ilave desarrollar charlas informativas y talleres motivacionales para ilustrar a las adolescentes de forma técnica y clínica sobre los riesgos que trae el hecho de someterse a un procedimiento de aborto, así mismo informar sobre las consecuencias para la salud de estas adolescentes y mas que todo las repercusiones que tendra para su vida futura.
- A los padres de familia que busquen ayuda especializada para poder informarse sobre los riesgos que lleva someter al aborto a una madre adolescente y asi mismo promover conversaciones en familia sobre este tema muy importante para el desarrollo de la adolescente.
- A las adolescentes ser más curiosas en conocer sobre el aborto y las consecuencias en la salud para la persona que se someta a este procedimiento, ya que esto les va a permitir ser mas responsables al momento de mantener intimidad con sus parejas y asi evitar un embarazo no deseado, lo cual traera serias compliaciones en su salud.

BIBLIOGRAFÍA

1. DIRESA - Puno, Indicadores de Resultados de Salud en morbi, muerte materna en adolescentes, 2017.
2. La maternidad en el Perú está empezando desde los 11 años Perú (Lima). Diario Perú 21. 16 de julio de 2017.
3. UNICEF. Hacia la promoción y rescate de la lactancia materna. Venezuela. Disponible en: <http://www.unicef.org/venezuela/spanish/lactancia.pdf>
4. Encuesta nacional de demografía y salud familiar (ENDES), INEI. Cap. 10. Aborto en adolescentes, Lima, Perú. 2017. Disponible en: http://www.unicef.org/peru/spanish/media_26570.htm.
5. García Odio A, González Suárez M. Factores de riesgo asociados a embarazadas adolescentes. Rev Ciencias Médicas. 2018; 22(3).
6. Escobar Martínez C, "Características del embarazo en adolescentes en Guatemala. Estudio realizado con base en la encuesta nacional de salud materno infantil 2008-2009.", Guatemala, 2017.
7. Solares Valdez N, "Caracterización epidemiológica y tratamiento de la paciente post aborto", [Tesis maestría], Guatemala 2015.
8. Morovejo Ysuhaylas M, "Características epidemiológicas de las pacientes que presentaron aborto espontáneo en el servicio de Gineco-Obstetricia en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales durante el periodo enero-diciembre 2017" [licenciatura]. Universidad Privada San Juan Bautista, 2017.
9. Rios Canales C, Vera Veliz R, "Aborto en adolescentes atendidas en el Hospital I. Florencia de Mora. EsSalud. Enero 2016 – Diciembre 2017". [licenciatura]. Universidad Nacional de Trujillo, 2017.

10. Guerrero Córdova I, “Características clínico epidemiológicas de las pacientes con diagnóstico de aborto en el hospital de apoyo nuestra señora de las mercedes-paita durante el período julio a diciembre 2017”, Universidad Nacional de Piura, Piura 2018.
11. Urcuhuaranga Upiachihuay L, “Características sociodemográficas, obstétricas y clínicas de los abortos en adolescentes atendidas en el Hospital II-1 de Moyobamba – San Martín 2014”, Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Facultad de Medicina Humana, 2015.
12. Trujillo Mamani G, Sembrera Farceque E, “Conocimientos y actitudes sobre el aborto inducido en adolescentes del 5to año de secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Las Mercedes, Juliaca 2015”, Universidad Peruana Unión, 2015.
13. Delgado Corrales N, “Factores asociados al aborto en las adolescentes de 11 a 18 años que acuden al hospital de Santa Rosa de Puerto Maldonado de abril a junio del 2018”, Universidad Nacional del Altiplano, Puno 2018.
14. Organización Mundial de la Salud. Desarrollo de la Adolescencia. Maternal Child. [Revista en Internet].; 2016 [Acceso 2 de agosto del 2017]. Disponible en: http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/.
15. Ministerio de Salud. Orientaciones para la atención integral de las y los adolescentes en el Primer Nivel de Atención. [En línea]. Publicado; 2014 [Acceso 27 de diciembre del 2017]. Disponible en: <ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2014/RM917-2014-MINSA.pdf>.
16. Ministerio de Salud Pública, Diagnóstico y tratamiento del aborto espontáneo, incompleto, diferido y recurrente. Guayaquil - Ecuador: Dirección Nacional de Normatización; 2013, p. 41. Disponible en: http://www.maternoinfantil.org/archivos/smi_D503.pdf.
17. Bergés D., El aborto: Párrafo Introdutorio. El Aborto. 2016. Disponible en: <http://infoaborto.blogspot.com/2008/11/parrafo-introdutorio.html>

18. Ministerio de Salud del Perú. (2017). Situación de salud de los adolescentes y jóvenes en el Perú 2017 (1a ed.- ed.). Lima: Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública-MINSA. Obtenido de <http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4143.pdf>.
19. Issler JR. Embarazo en la Adolescencia, Revista de Posgrado de la Cátedra VI Medicina Argentina. [Internet]. 2001[Citado 02 diciembre 2016]. Disponible en: http://med.unne.edu.ar/revista/revista107/emb_adolescencia.html.
20. Merino EI, Inestroza ER. "Factores que influyen en el embarazo de las adolescentes inscritas en el programa de atención materna de unidad de salud altavista, enero a junio de 2010". Tesis para optar al grado de maestro en salud pública, El Salvador, 2011.
21. Campero L, & Kendall T., Estrategia Intersectorial de Prevención del Embarazo Adolescente y Planificación Familiar. salud pública de méxico. 2015;52 (1):61–69.
22. Misión Toda una Vida. Estrategía Nacional Intersectorial de Articulación para la Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos. 2015 p. 69. Disponible en: http://www.todaunavida.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/Proyecto_enia_p.pdf
23. Selena, Etapa de la Adolescencia. Psicología General. 2012. Disponible en:<http://selena-psicologiainfantil.blogspot.com/2009/01/etapapa-de-la-adolescencia.html>
24. Williamson, N., Maternidad en la niñez: Enfrentar el reto del embarazo en adolescentes- El estado de la población mundial 2013. 2013;132.
25. Williamson N. Maternidad en la niñez: Enfrentar el reto del embarazo en adolescentes- El estado de la población mundial 2013. 2013;132.
26. Jimenez, L. & Mendez, R. El Aborto: Tipos de aborto: El Aborto. 2016 Disponible en: <http://infoaborto.blogspot.com>

27. Reus R. Amenaza de aborto: causas, síntomas y tratamiento. Reproducción Asistida ORG. 2017 [citado el 8 de junio de 2019]. Disponible en: <https://www.reproduccionasistida.org/amenaza-de-aborto/>
28. Gabbe S, Niebyl J. Aborto espontáneo [Internet]. Salud180. 2011 [citado el 8 de junio de 2019]. Disponible en: <http://www.salud180.com/salud-z/aborto-espontaneo>
29. Organización Peruana de la Salud. El enfoque epidemiológico de riesgo en la atención a la salud. Manual sobre enfoque de riesgo en la atención 53 materno-infantil. 2° edición. Serie Paltex para ejecutores de programas de salud. 2000;2: 12-36.
30. Merino EI, Inestroza ER. "Factores que influyen en el embarazo de las adolescentes inscritas en el programa de atención materna de unidad de salud altavista, enero a junio de 2010". Tesis para optar al grado de maestro en salud pública, El Salvador, 2011.
31. García Odio A, González Suárez M. Factores de riesgo asociados a embarazadas adolescentes. Rev Ciencias Médicas. 2018; 22(3).
32. UNICEF Perú - Situación del país - Adolescencia (12 a 17 años) [Internet]. [cited 2018 Jan 8]. Available from: http://www.unicef.org/peru/spanish/children_13282.htm.
33. Iglesias J. Desarrollo del adolescente: aspectos físicos, psicológicos y sociales. *Pediatría Integral*; 2013: XVII(2): 91-94 [Revista en Internet].; 2017 [Acceso 17 de Julio del 2017]. Disponible en: <https://www.pediatriaintegral.es/numeros-anteriores/publicacion-201303/desarrollo-del-adolescente-aspectos-fisicos-psicologicos-y-sociales/>.
34. Mamani H, Lisbeth R, Coaquira R, Hermelinda A. Factores asociados a Embarazos en Adolescentes en el Hospital Carlos Monge Medrano Juliaca 2016. Repositorio Institucional - UANCV [Internet]. 11 de abril de 2016 [citado 18 de febrero de 2018]; Disponible en: <http://localhost:8080/xmlui/handle/UANCV/700>.

35. Ballena C. características poblacionales y factores asociados a embarazo en adolescentes en el hospital José Cayetano Heredia, julio – diciembre 2016 - Piura. Universidad César Vallejo; 2016.
36. Organización mundial de la salud. Embarazo en la adolescencia. Lima, Perú. 2017.

ANEXOS

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA

“FACTORES DETERMINANTES QUE INCIDEN EN EL ABORTO Y LAS CONSECUENCIAS EN LA SALUD DE LAS ADOLESCENTES DE 15 A 18 AÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD METROPOLITANO I - 3 ILAVE-2021”.

<u>Planteamiento del problema</u>	<u>Hipótesis</u>	<u>Objetivos</u>	<u>Variables</u>	<u>dimensiones</u>	<u>Indicadores</u>	<u>Instru mento</u>
<p>Problema General: ¿Cuáles son los factores determinantes que influyen en el aborto y sus consecuencias en la salud de las adolescentes que asisten al Centro de Salud Metropolitano I - 3 llave en el año 2021?</p> <p>Problema específico: - ¿Cuáles son los factores determinantes de índole social y personal que influyen en el aborto en las adolescentes que asisten al Centro de Salud Metropolitano I - 3 llave en el año 2021? - ¿Cuáles son las consecuencias en la salud producidas por el aborto en las adolescentes que asisten al Centro de Salud Metropolitano I - 3 llave en el año 2021 producto del aborto?</p>	<p>HIPÓTESIS GENERAL: Existen diversos factores determinantes que inducen el aborto y vienen causando daño en la salud de las adolescentes que asisten al Centro de Salud Metropolitano I - 3 llave en el año 2021.</p> <p>HIPÓTESIS ESPECÍFICA: - Los factores sociales y personales vienen influyendo en el aborto en las adolescentes que asisten al Centro de Salud Metropolitano I - 3 llave en el año 2021. - Las adolescentes que asisten al Centro de Salud Metropolitano I - 3 de llave, están siendo afectadas en su salud como consecuencia del aborto practicado.</p>	<p>OBJETIVO GENERAL: Identificar cuáles son los factores determinantes que influyen en el aborto y sus consecuencias en la salud de las adolescentes que asisten al Centro de Salud Metropolitano I - 3 llave en el año 2021.</p> <p>OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Identificar cuales son los factores determinantes de índole social y personal que influyen en el aborto en las adolescentes que asisten al Centro de Salud Metropolitano I - 3 llave en el año 2021. - Establecer cuáles son las consecuencias en la salud de las adolescentes que asisten al Centro de Salud Metropolitano I - 3 llave en el año 2021 producto del aborto.</p>	<p>Variable independiente: Factores que determinan el aborto en adolescentes .</p> <p>Variable dependiente : Factores sociales y personales que determinan el aborto.</p> <p>Consecuencias en la salud física de la madre adolescente.</p>	<p>- El aborto.</p> <p>Factores que determinan el aborto de la madre adolescente.</p> <p>Problemas en la salud física.</p>	<p>Conocimiento sobre el aborto. Conocimiento sobre las consecuencias del aborto.</p> <p>- Factores sociales. Por influencia de los amigos. Por influencia de la familia.</p> <p>- Factores personales sobre el aborto. Por miedo a su familia. por influencia de la pareja.</p> <p>- Complicaciones en la salud de la madre adolescente. - Riesgo de vida de la madre adolescente.</p>	<p>Entrevista y cuestionario .</p> <p>Entrevista y cuestionario .</p>

ANEXO 02: GUÍA PARA LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA EL EXPERTO.

GUÍA PARA LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA EL EXPERTO

Instructivo:

Marque el recuadro que corresponda a su respuesta y escriba en los espacios en blanco sus observaciones y sugerencias en relación a los ítems propuestos. Emplee los siguientes criterios de evaluación.

DE ACUERDO	EN DESACUERDO
A	D

ITEMS	ASPECTOS A CONSIDERAR	A	D
1	Las preguntas responden a los objetivos de la investigación	A	
2	Los ítems miden las variables de estudio	A	
3	El instrumento persigue los fines del objetivo general	A	
4	El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos	A	
5	Las ideas planteadas son representativas del tema	A	
6	Hay claridad en los ítems	A	
7	Las preguntas responden a un orden lógico	A	
8	El número de ítems por dimensiones es el adecuado	A	
9	El número de ítems por indicador es el adecuado	A	
10	La secuencia planteada es adecuada	A	
11	Las preguntas deben ser reformuladas*		D
12	Debe considerar otros ítems*		D

* Explique al final

Observaciones:

Sugerencias:



Alberto HERRERA MENDOSA
MÉDICO CIRUJANO
C.M.P. 670130



LIC. EN ENFERMERÍA
C.O.P. 30223



Carla C. Medina Del Valle
OBSTETRA
C.O.P. 30223

ANEXO 03: MATRIZ PARA LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO.

MATRIZ DE VALIDACIÓN PARA MEDIR LA VALIDEZ DEL INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS PARA EL CUESTIONARIO APLICADO

N°	Dimensiones/ITEMS	Pertinencia		Relevancia		Claridad		Sugerencia
		Si	No	Si	No	Si	No	
1	Edad de la adolescente.	X		X		X		APLICAR
2	Zona de residencia.	X		X		X		APLICAR
3	Estado civil.	X		X		X		APLICAR
4	Grado de instrucción.	X		X		X		APLICAR
5	Con quien vive actualmente.	X		X		X		APLICAR
6	Ocupación de la adolescente.	X		X		X		APLICAR
7	Recurrencia del aborto	X		X		X		APLICAR
8	Orientación sobre consecuencias del aborto	X		X		X		APLICAR
9	Se sometio a un aborto clandestino y peligroso.	X		X		X		APLICAR
10	Tuvo información de las consecuencias en la salud sobre el aborto que se practico.	X		X		X		APLICAR
11	Aceptaría abortar por influencia de las amigas.	X		X		X		APLICAR
12	Tiene miedo a lo que dirán sus amigos y amigas sobre su embarazo.	X		X		X		APLICAR
13	Ha recibido influencia de sus familiares para poder abortar.	X		X		X		APLICAR
14	Tuvo complicaciones en el aborto practicado.	X		X		X		APLICAR
15	Presentó dolor abdominal.	X		X		X		APLICAR
16	Presentó sangrado vaginal.	X		X		X		APLICAR
17	Presentó dolor lumbar.	X		X		X		APLICAR
18	Ha presentado fiebre alta y escalofríos	X		X		X		APLICAR

Nombres y Apellidos	Cargo	Porcentaje Obtenido	Valoración
ALBERTO FIGUEROA MENDOZA	MEDICO	95%	ACEPTABLE
SONIA K. TITO GUISPE	ENFERMERA	95%	ACEPTABLE
CARLA C. MENNA DEL VALLE	OBSTETRA	93%	ACEPTABLE

Valoración :
 De 40% a 65% : Inceptable.
 De 70% a 80% : Mínimamente Aceptable.
 De 85% a 100% : Aceptable.


 ALBERTO FIGUEROA MENDOZA
 MEDICO GRUPO A
 EXP. 50000


 SONIA K. TITO GUISPE
 ENFERMERA
 EXP. 50000


 Carla C. Menna del Valle
 OBSTETRA
 U.O.P. 30999

ANEXO 04: CUESTIONARIO APLICADO.

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

ENTREVISTA - CUESTIONARIO "FACTORES DETERMINANTES QUE INCIDEN EN EL ABORTO Y LAS CONSECUENCIAS EN LA SALUD DE LAS ADOLESCENTES DE 15 A 18 AÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD METROPOLITANO I - 3 ILAVE-2021"

Estimada adolescente, queremos que considere la encuesta a fin de poder determinar cuáles son los FACTORES DETERMINANTES QUE INCIDEN EN EL ABORTO Y LAS CONSECUENCIAS EN LA SALUD DE LAS ADOLESCENTES DE 15 A 18 AÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD METROPOLITANO I - 3. Agradezco anticipadamente por su valiosa colaboración:

Presentación

Por favor marque la respuesta que usted crea correcta, se agradece su colaboración

I. Datos Generales

Instrucciones: Antes de empezar con la prueba nos gustaría que contestara unas preguntas generales sobre usted, marque con un aspa (X).

MARQUE CON UNA X EL CASILLERO QUE CORRESPONDA:

1. EDAD DE LA ADOLESCENTE:

10 – 13 años () 14 – 16 años () 17 – 18 años ()

2. ZONA DE RESIDENCIA

Urbano () Rural () Urbano Marginal ()

3. ESTADO CIVIL

Soltera () Casada () Unión libre ()

4. GRADO DE INSTRUCCIÓN

Primaria () Secundaria () Técnico y/o Superior

5. CON QUIEN VIVE ACTUALMENTE

Padres () Pareja () Sola ()

6. OCUPACIÓN

Ama de casa () Comerciante () Estudiante ()

7. RECURRENCIA DEL ABORTO

Primera vez () Segunda vez () Tercera vez ()

8. ORIENTACION SOBRE CONSECUENCIAS DEL ABORTO

Si No

9. SE SOMETIO A UN ABORTO CLANDESTINO Y PELIGROSO.

Si No

10. TUVO INFORMACION DE LAS CONSECUENCIAS EN LA SALUD SOBRE EL ABORTO QUE SE PRACTICO.

Si No

11. ACEPTARÍA ABORTAR POR INFLUENCIA DE LAS AMIGAS.

Si No

12. TIENE MIEDO A LO QUE DIRÁN SUS AMIGOS Y AMIGAS SOBRE SU EMBARAZO.

Si No

13. HA RECIBIDO INFLUENCIA DE SUS FAMILIARES PARA PODER ABORTAR.

Si No

14. TUVO COMPLICACIONES EN EL ABORTO PRACTICADO.

Si No

15. PRESENTÓ DOLOR ABDOMINAL.

Si No

16. PRESENTÓ SANGRADO VAGINAL.

Si No

17. PRESENTÓ DOLOR LUMBAR.

Si No

18. HA PRESENTADO FIEBRE ALTA Y ESCALOFRÍOS

Si No



Alberto NERMA MENDOZA
MEDICO CIRUJANO
C.M.P. 060330
Carlos R. Tiba
Carla G. Del Valle
OBSTETRA
C.O.P. 30223

ANEXO 05: FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO.

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS
 FACULTAD DE CIENCIAS
 ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA
 FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO SOBRE LOS FACTORES
 DETERMINANTES QUE INCIDEN EN EL ABORTO Y LAS CONSECUENCIAS EN LA
 SALUD DE LAS ADOLESCENTES DE 15 A 18 AÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE
 SALUD METROPOLITANO

Solicitar tu autorización para que participes en el presente estudio de investigación que está siendo desarrollado por la Egresada de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Privada San Carlos con el fin de optar el grado académico de bachiller en enfermería cuyo título es: "FACTORES DETERMINANTES QUE INCIDEN EN EL ABORTO Y LAS CONSECUENCIAS EN LA SALUD DE LAS ADOLESCENTES DE 15 A 18 AÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD METROPOLITANO I - 3 ILAVE-2021", para ello espero su apoyo y su colaboración.

Debes saber que:

- ❖ Tu participación en este estudio es completamente Voluntaria y Confidencial, pues solo la investigadora tendrá acceso a esta información, por tanto será protegida.
- ❖ La aplicación de la entrevista oral y el cuestionario se realizara en tiempos diferentes, en horarios acordados con su persona para no perjudicarte en tus actividades cotidianas.
- ❖ El cuestionario desarrollará a través de una entrevista oral tiene una duración de 25 a 30 minutos; consiste en responder frases sobre los factores determinantes que inciden en el aborto y las consecuencias en la salud de las adolescentes de 15 a 18 años que asisten al Centro de Salud Metropolitano I - 3 Ilave.
- ❖ Tu información será procesada, analizada y transferida siempre de manera confidencial. Agradeciendo por anticipado tu participación.


 ALBERTO MEJIA MENDOZA
 MEDICO CIRUJANO
 C.M.P. 060330


 Alberto Mejia Mendoza
 C.M.P. 060330


 Cecilia F. Del Valle
 OBSTETRA
 C.O.P. 30223

ANEXO 06: DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO.

DECLARACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo:..... en calidad de paciente del Centro de Salud Metropolitano de la ciudad de Ilave, otorgo mi consentimiento para poder formar parte de la entrevista así mismo resolver el cuestionario que se aplicará como parte del estudio denominado "FACTORES DETERMINANTES QUE INCIDEN EN EL ABORTO Y LAS CONSECUENCIAS EN LA SALUD DE LAS ADOLESCENTES DE 15 A 18 AÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD METROPOLITANO I - 3 ILAVE-2021".

Propósito de la investigación: El siguiente estudio de investigación le propone la egresada en enfermería FLORA IQUISE FLORES de la Universidad Privada San Carlos, a fin de implementar la Tesina como requisito para optar el grado académico de bachiller en Enfermería, se desea obtener información sobre cuáles son los FACTORES DETERMINANTES QUE INCIDEN EN EL ABORTO Y LAS CONSECUENCIAS EN LA SALUD DE LAS ADOLESCENTES DE 15 A 18 AÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD METROPOLITANO I - 3 ILAVE:

Que se hará: Si acepto participar en este estudio se me realizará una breve entrevista con el llenado del respectivo cuestionario con respuestas simples a contestar sobre el tema a investigar.

Riesgos: La participación en este estudio no posee riesgos. Ya que los datos serán preservados en el anonimato,

Beneficios: Como resultado de mi participación en este estudio no obtendré ningún beneficio directo, sin embargo, es posible que el investigador aprenda más acerca de los FACTORES DETERMINANTES QUE INCIDEN EN EL ABORTO Y LAS CONSECUENCIAS EN LA SALUD DE LAS ADOLESCENTES DE 15 A 18 AÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD METROPOLITANO I - 3 ILAVE.

Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con la investigadora anteriormente mencionada y ella debe contestar satisfactoriamente sus inquietudes e interrogantes.

Debo de entregar una copia de esta firmada. Mi participación en este estudio es confidencial mientras que los resultados podrían aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica, pero de una manera anónima.

Consentimiento:

He leído y se me ha explicado toda la información descrita en este formulario antes de firmarlo, se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido contestadas en forma adecuada a mis requerimientos. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación.

FIRMA DEL ENTREVISTADO: _____

FIRMA DE LA INVESTIGADORA: _____

FLORA IQUISE FLORES


 Alberto ALVARO MENDOZA
 MEDICO CIRUJANO
 C.M.R. 060332


 Sonia E. Pino Quipe
 C.O.P. 30223


 Carla Y. Rodríguez Del Valle
 OBSTETRA
 C. O. P. 30223

ANEXO 07: SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TESINA.

SOLICITO: Solicito AUTORIZACION PARA REALIZAR TRABAJO DE IMPLEMENTACION PARA INFORME FINAL DE TESIS.

Lic. Yuri BARREDA ARPI
JEFE DEL C.S. METROPOLITANO

REFERENCIA: MEMORANDO MULTIPLE N° 270-2021-UPSC-DUI/CIFC

Yo, Flora IQUISE FLORES; IDENTIFICADO CON DNI: 40698496, con domicilio en el Jr. Independencia S/N de esta ciudad de Ilave, ante usted me presento con respeto y expongo lo siguiente:


Que, siendo alumna de la Universidad Privada San Carlos de la Escuela Profesional de Enfermería, así mismo poner en conocimiento que mi persona viene realizando trabajo de implementación del informe final de tesis titulado: "NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ANEMIA FERROPÉNICA Y ADMINISTRACIÓN DE MICRONUTRIENTES EN MADRES CON NIÑOS MENORES A TRES AÑOS QUE ASISTEN AL CENTRO DE SALUD METROPOLITANO I - 3 ILAVE – 2021"

Cabe indicar que la muestra y población del estudio estará conformada por la "madres de la Población del C.S. Metropolitano". Para lo cual solicito la autorización para poder realizar la implementación del informe final de tesis.

Por todo lo expuesto solicito a Ud. Acceder a mi petición por ser de justicia.

Ilave, 16 de noviembre del 2021.

Atentamente;


.....
FLORA IQUISE FLORES
DNI N° 42457325



Recibido
16-11-2021

ANEXO 08: DOCUMENTO QUE OTORGA EL PERMISO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.



C. S. METROPOLITANO I-3 ILAVE

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Ilave, 22 de Noviembre del 2021.

OFICIO Nº 601 2021 –GR-PUNO/DIRESA-PUNO/RED-COLLAO/C.S. METROPOLITANO

Señor.

Srta. Flora Iquise Flores

Bach. De la E.P. de Enfermería de la UP San Carlos - Puno

Presente.-

ASUNTO: Autorización para ejecución de su proyecto sobre anemia ferropénica y administración de micronutrientes en madres con niños menores a tres años que asisten al centro de salud metropolitano I- 3 Ilave – 2021

REF: Solicitud presentada por la interesada

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo muy cordialmente y al mismo tiempo deseándole que nuestro padre celestial colme de grandes bendiciones y expresar lo siguiente:

Que, visto su solicitud para ejecutar el informe final de su proyecto de tesis, nuestra administración autoriza realizar el plan proyectado para el 20 de Noviembre del presente año, en el horario de 10:00 a 11:30 am, en coordinación con el personal de enfermería a cargo en el día fijado con las madres de familia con niños menores de 3 años.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mis consideraciones distinguidas y estima personal.

Atentamente,

C.c. Arch

YBA/rar



ANEXO 09: IMÁGENES FOTOGRÁFICAS QUE EVIDENCIAN EL TRABAJO DE CAMPO.





ANEXO 10: FIGURAS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.




Figura 01: El aborto.



Figura 02: Factores que determinan el aborto (factores sociales y factores personales)



Figura 03: Consecuencias en la salud de la madre adolescente por practicarse el aborto.