

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS

FACULTAD DE CIENCIAS

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA



TESIS

**FACTORES ASOCIADOS EN EL ABANDONO DE MÉTODOS
ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES DEL CENTRO DE SALUD I-3 VALLECITO,
PUNO-2023**

**PRESENTADA POR:
FLORA QUISPE TICONA**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
LICENCIADA EN ENFERMERÍA**

PUNO – PERÚ

2023



Repositorio Institucional ALCIRA by [Universidad Privada San Carlos](https://www.upsc.edu.pe/) is licensed under a [Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)



11.41%

SIMILARITY OVERALL

0%

POTENTIALLY AI

SCANNED ON: 23 JUN 2023, 8:09 PM

Similarity report

Your text is highlighted according to the matched content in the results above.

● IDENTICAL
1.92%

● CHANGED TEXT
9.48%

Report #17497601

FLORA QUISPE TICONA FACTORES ASOCIADOS EN EL ABANDONO DE MTODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES DEL CENTRO DE SALUD I-3 VALLECITO, PUNO-2023 RESUMEN Este estudio tuvo como propsito determinar los factores asociados en el abandono de mtodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.

13 El enfoqu fue cuantitativo, de nivel correlacional, el diseo no experimental y de corte transversal.

La poblacin se conform de 400 mujeres, y se seleccion la muestra de 197, que se obtuvo por muestra probabilstica aleatoria simple.

19 26 La tcnica utilizada fue una encuesta, y se aplic un cuestionario como instrumento de recoleccin de datos.

Los resultados evidenciaron que los factores tuvieron influencia en el 58% de las mujeres que abandonaron los mtodos anticonceptivos; segn cada dimensin, el 57% de las mujeres s fueron influenciadas por los factores institucionales, en el 62% los factores socioculturales y en el 65% los factores personales. En conclusin, se pudo establecer una asociacin entre los factores asociados y el abandono de los mtodos

anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno 2023. PALABRAS CLAVE: Factores asociados, abandono, mtodos anticonceptivos femeninos, fracaso anticonceptivo. ABSTRACT The purpose of this study was to determine the factors associated

Yudy Roxana ALANIA LAQUI

Oficina de Repositorio Institucional

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS

FACULTAD DE CIENCIAS

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

TESIS

FACTORES ASOCIADOS EN EL ABANDONO DE MÉTODOS
ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES DEL CENTRO DE SALUD I-3 VALLECITO,
PUNO-2023

PRESENTADA POR:
FLORA QUISPE TICONA

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
LICENCIADA EN ENFERMERÍA

APROBADA POR EL SIGUIENTE JURADO:

PRESIDENTE

:


Dra. NOEMI ELIDA MIRANDA TAPIA

PRIMER MIEMBRO

:


Mtra. MARITZA KARINA HERRERA PEREIRA

SEGUNDO MIEMBRO

:


Mg. IBETH MAGALI CHURATA QUISPE

ASESOR DE TESIS

:


Mg. LUIS ALBERTH ROSSEL BERNEDO.

Área: Ciencias Médicas, Ciencias de Salud

Sub Área: Ciencias de la Salud

Líneas de Investigación: Ciencias Socio Biomédicas

Puno, 07 de Julio del 2023

DEDICATORIA

Agradezco a Dios por otorgar salud, orientación y por acompañarme, brindándome la inspiración necesaria para enfrentar los desafíos de la vida y su amor me ha permitido realizar las cosas de manera correcta y comprender que con perseverancia y amor se puede lograr todo en esta vida.

A mis padres Carmen Ticona y Aurelio Quispe, quienes con su sacrificio y esfuerzo me apoyaron en el transcurso de la formación de mi carrera profesional y los consejos, valores, motivación constante que me ha permitido ser una persona de Bien.

Quiero expresar mi gratitud a mis hermanos Esteban, Hugo, Yesica y Celina por estar siempre a mi lado en todo momento, agradezco profundamente su constante apoyo y amistad incondicional.

A mi novio Jhon E. por todo su amor, paciencia y apoyo incondicional. También quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado y participado en mi proceso de formación como enfermera.

AGRADECIMIENTO

A mi primera casa superior de estudios, Universidad privada san Carlos - Puno, por darme la oportunidad de formarme profesionalmente.

A los docentes de la escuela profesional de Enfermería, por impartir conocimientos y experiencias durante mi formación profesional.

A los miembros del jurado calificador: Mtra. Maritza Karina Herrera Pereyra, Dra. Noemí Elida Miranda Tapia, M.Sc. Ibeth Magali Churata Quispe por las observaciones y contribuciones que favorecieron y proporcionaron desarrollar satisfactoriamente el presente proyecto de investigación de tesis.

A mi asesor de tesis: Mg Luis Alberth Rossel Bernedo por su disposición, orientación y apoyo incondicional durante el desarrollo y Culminación del trabajo de investigación.

Al personal del Centro de salud vallecito I-3, en especial a las mujeres que fueron partícipes de la presente investigación por las facilidades, colaboración y tiempo que me concedieron para poder llevar a cabo esta investigación.

ÍNDICE GENERAL

	Pág.
DEDICATORIA	1
AGRADECIMIENTO	2
ÍNDICE GENERAL	3
ÍNDICE DE TABLAS	5
ÍNDICE DE FIGURAS	6
ÍNDICE DE ANEXOS	7
RESUMEN	8
ABSTRACT	9
INTRODUCCIÓN	10

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	12
1.1.1 PROBLEMA GENERAL	14
1.1.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS	14
1.2 ANTECEDENTES	14
1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	18
1.3.1 OBJETIVO GENERAL	18
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	18

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 MARCO TEÓRICO	19
2.1.1 FACTORES ASOCIADOS AL ABANDONO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS	19
2.1.2 MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS	20
	3

2.1.3 PLANIFICACIÓN FAMILIAR	22
2.2 MARCO CONCEPTUAL	22
2.3 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN	23
2.3.1 HIPÓTESIS GENERAL	23
2.3.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS	23
CAPÍTULO III	
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	
3.1 ZONA DE ESTUDIO	24
3.2 TAMAÑO DE MUESTRA	24
3.3 MÉTODO Y TÉCNICAS	25
3.4 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES	26
3.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE	26
3.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE	26
3.5 MÉTODO O DISEÑO ESTADÍSTICO	26
CAPÍTULO IV	
EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS	
CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS	30
CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS	33
CONCLUSIONES	41
RECOMENDACIONES	42
BIBLIOGRAFÍA	43
ANEXOS	49

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
Tabla 01: Factores asociados en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.	28
Tabla 02: Relación entre factores y el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.	30
Tabla 03: Factores institucionales se asocian en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.	32
Tabla 04: Relación entre factores institucionales y el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.	33
Tabla 05: Factores socioculturales se asocian en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.	35
Tabla 06: Relación entre factores socioculturales y el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.	36
Tabla 07: Factores personales se asocian en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.	37

ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
Figura 01: Factores asociados en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.	29
Figura 02: Factores institucionales se asocian en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.	32
Figura 03: Factores socioculturales se asocian en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.	35
Figura 04. Factores personales se asocian en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.	38

ÍNDICE DE ANEXOS

	Pág.
Anexo 01: Matriz de consistencia	50
Anexo 02: Instrumento	52
Anexo 03: Consentimiento informado	56
Anexo 04: Datos procesados del programa SPSS	57
Anexo 05: Autorización del Centro de Salud I-3 Vallecito	63
Anexo 06: Evidencias fotográficas	65

RESUMEN

Este estudio tuvo como propósito determinar los factores asociados en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023. El enfoque fue cuantitativo, de nivel correlacional, el diseño no experimental y de corte transversal. La población se conformó de 400 mujeres, y se seleccionó la muestra de 197, que se obtuvo por muestra probabilística aleatoria simple. La técnica utilizada fue una encuesta, y se aplicó un cuestionario como instrumento de recolección de datos. Los resultados evidenciaron que los factores tuvieron influencia en el 58% de las mujeres que abandonaron los métodos anticonceptivos; según cada dimensión, el 57% de las mujeres sí fueron influenciadas por los factores institucionales, en el 62% los factores socioculturales y en el 65% los factores personales. En conclusión, se pudo establecer una asociación entre los factores asociados y el abandono de los métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno – 2023.

Palabras clave: Factores asociados, abandono, métodos anticonceptivos femeninos, fracaso anticonceptivo.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the factors associated with the abandonment of contraceptive methods in women at the Health Center I-3 Vallecito, Puno-2023. The approach was quantitative, correlational level, non-experimental and cross-sectional design. The population was made up of 400 women, and the sample of 197 was selected, which was obtained by a simple random probabilistic sample. The technique used was a survey, and a questionnaire was applied as a data collection instrument. The results showed that the factors influenced 58% of the women who abandoned contraceptive methods; according to each dimension, 57% of the women were influenced by institutional factors, 62% by sociocultural factors and 65% by social factors. personal. In conclusion, it was possible to establish an association between the associated factors and the abandonment of contraceptive methods in women of the Health Center I-3 Vallecito, Puno - 2023.

Key words: Associated factors, abandonment, female contraceptive methods, contraceptive failure.

INTRODUCCIÓN

Las variables institucionales, sociales, culturales y personales, actuando individualmente o en combinación, tienen un efecto positivo o negativo en la determinación de las mujeres respecto al desistimiento de los métodos anticonceptivos, son factores asociados (1).

Para satisfacer los requerimientos de su población y las necesidades de salud sexual y reproductiva, MINSA ofrece una amplia variedad de opciones anticonceptivas. Son muy eficaces, accesibles y fáciles de usar. Entre ellos se encuentran opciones de larga duración, como el dispositivo intrauterino (DIU) y el implante subdérmico (2).

Los métodos anticonceptivos hoy en día existen en distintos tipos, modos de uso, vías de administración y tiempos de renovación, facilitando de cierta manera la utilización de estos por parte de las mujeres. Sin embargo, surgen problemas cuando hay factores que influyeron en las elecciones de métodos en particular.

El objetivo principal del profesional que trabaja en servicios relacionados con este tema es promover la salud integral de la mujer, abarcando su bienestar físico, mental y emocional. Además, se encarga de brindar información sobre las posibles relaciones del cuerpo ante los usos de métodos anticonceptivos. Esta atención brindaba en primer altitud de atención, específicamente en centros y puestos de salud, y se caracteriza por ser periódica, individual y abordar la salud de manera integral (3).

Hoy en día las mujeres son y deben ser las responsables del uso de métodos anticonceptivos, porque será su cuerpo es el que experimentará los cambios debido a medicamentos anticonceptivos, será su cuerpo el que aloje a un producto por nueve meses si no llegara a utilizar estos métodos para cuidarse, no será el cuerpo de otra persona.

La presente investigación consta de:

Capítulo I, comprende el planteamiento del problema, antecedentes y objetivos del estudio.

capítulo II, abarca el marco teórico, conceptual y la hipótesis de investigación. Capítulo

III, contiene la metodología de la investigación.

Capítulo IV, comprende la exposición y análisis de los resultados. Finalmente, la investigación presenta la bibliografía y anexos.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El método anticonceptivo se refiere a un conjunto de medidas que disminuyen de manera significativa las posibilidades de embarazo en mujer en edad fértil. Estas técnicas son beneficiosas tanto para hombres como para mujeres al permitirles alcanzar sus objetivos reproductivos de forma saludable (4).

Actualmente, el uso de anticonceptivos está influenciado por una variedad de razones. Estas razones abarcan desde aspectos culturales, como el empoderamiento de las mujeres en el control de su propio cuerpo, hasta la elección de adolescentes que utilizan anticonceptivos para prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos no planificados. Es preocupante el problema que se plantea en las planificaciones familiares en relación con la discontinuación de métodos anticonceptivos, especialmente de poca duración. Pese a los considerables progresos significativos de crecimientos numerosos de método anticonceptivo, el abandono de estos métodos sigue siendo un desafío que resulta en gestantes no aspirados y las complicaciones asociadas a ellos (5).

La OMS reportó que un 4.794 de mujeres dejaron de utilizar métodos anticonceptivos y quedaron embarazadas de manera inesperada. De ese grupo, el 56% de las embarazadas no habían utilizado ningún método anticonceptivo durante cinco años anteriores al embarazo. El 9,9% utilizó métodos convencionales, como el coitus

interruptus, mientras que un 31,2% utilizó tácticas contemporáneas de acción reducida, tanto pastillas como preservativos. Además, un 2,6% utilizó tácticas reversibles de acción prolongada tanto dispositivo intrauterino o los implantes, pero aun así experimentaron embarazos no deseados (6).

Menos de la mitad de la población de cada una de estas naciones utiliza una técnica anticonceptiva, siendo Haití el país con la tasa más baja (28%), Guatemala (38%) y Bolivia (48%). En Latinoamérica y Caribe, la tasa en cuanto al uso de anticonceptivos es del 70%, mayor en América del Sur y menor en América Central, con un 64% (7).

A nivel nacional, según el dato de la encuesta demográfica y de salud del Perú 2020, un 45,5% de los adultos dejó de usar su técnica anticonceptiva, de las cuales el 13,5% alegó diversas razones relacionadas con el método, el 8,6% efectos adversos y el 5,9% falla del método (8).

Según la INEI refiere que solo el 2,8% de las mujeres en Lima recibió asistencia de un agente de salud, un 13,1% visitó el centro de salud y los que no participaron en sesiones educativas de planificación familiar fue el 44,5%. Estos datos indican que la gran mayoría de personas no tenían conocimiento sobre anticoncepción para así apropiarse de decisiones informada, constituyendo un riesgo que las usuarias podrían abandonar el método debido a los mitos sobre la eficacia o posibles efectos secundarios negativos, de los que deberían haber sido conscientes antes de seleccionar la estrategia (9).

Analizar las causas de la interrupción de los métodos anticonceptivos es crucial porque permite identificar y aplicar soluciones que permitan a las pacientes seguir utilizando la forma de anticoncepción que mejor se adapte a sus necesidades y tren de vida. Los factores como las edades de las mujeres, su salud, disposición de su pareja, su comportamiento sexual, así como peligros y logros asociados a cada cosa de métodos anticonceptivos, influyen en su decisión sobre qué método utilizar.

1.1.1 PROBLEMA GENERAL

¿Cuáles son los factores asociados en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023?

1.1.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS

- ¿Cuáles son los factores institucionales asociados en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023?
- ¿Cuáles son los factores socioculturales asociados en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023?
- ¿Cuáles son los factores personales asociados en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023?

1.2 ANTECEDENTES

A nivel internacional

Daza J. (10) en el año 2021 desarrolló un estudio titulado: “Factores asociados al abandono de métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértiles del Centro de Salud La Esperanza, Ecuador”, se empleó la metodología cuantitativa y analítica de diseño casos- y controles, como muestra abarcó a 60 casos y 60 controles, se recopilaron los datos mediante los cuestionarios. En cuanto a los resultados revelaron una asociación significativa a deserción de método anticonceptivo, como la falta de comprensión de las informaciones sobre los métodos anticonceptivos ($p=0,00$; $OR=107,66$), factores sociales pertenecientes al grupo de edad de 15 a 25 años ($p=0,00$; $OR=5,92$) y factores culturales como las creencias sobre la esterilidad ($p=0,00$; $OR=14,33$). Concluyendo que estos factores están efectivamente asociados al abandono de métodos anticonceptivos.

Thobani R. et al. (11) en el año 2019 efectuó un trabajo investigativo titulado “Factores asociados con la interrupción de los métodos anticonceptivos modernos dentro de los seis meses posteriores a su uso en comparación con el uso continuado de métodos modernos durante al menos seis meses en áreas de bajos ingresos de Karachi,

Pakistán”, guiado por medio de un estudio cuantitativo, descriptivo correlacional, tomando como muestra a 276 madres; utilizando un cuestionario sobre factores asociados, alcanzó obtener estos resultados donde revelaron que existen factores asociados con las interrupciones de los métodos anticonceptivos modernos. Estos principios incluyen pertenecer a la etnia sindhi (OR: 2,54, IC del 95%: 1,16–5,57), experimentar principios secundarios (OR: 15,12; IC 95% 7,50–30,51) y tener dificultades a llegar a las clínicas (OR: 4,10, IC 95 % 2,38–7,05). Conclusión el abandono del uso de método anticonceptivo fue problemas para acudir al centro de salud.

Torres M. (12) en el año 2018, desarrolló un estudio titulado “Factores asociados al abandono del método anticonceptivo hormonal por las mujeres de la parroquia”, tipo de investigación cuantitativo, descriptivo, su muestra consistió en 256 mujeres a quienes se les administró una encuesta. Los resultados revelaron que existen varios factores relacionados al abandono de métodos anticonceptivos, como las principales adversidades, las gestantes, doctrinas, entre varios. Concluyendo que determinaron factores que sí influyeron al uso de los métodos anticonceptivos.

A nivel nacional

Colca M. (13) en el año 2021 elaboró un estudio titulado: “Factores asociados al abandono de los métodos anticonceptivos hormonales según evidencias en los años 2016-2021”, en donde realizó revisiones sistemáticas de los enfoques cualitativos, realizando exhaustivas revisiones de las literaturas científicas publicadas en diferentes bases de datos y revistas indexadas, analizando un total de 32 artículos. Los resultados obtenidos demostraron que existen varios factores relacionados a la dejadez de métodos anticonceptivos hormonales. Entre las circunstancias personales identificadas se encuentran la edad, efecto secundario, la paridad, el número de hijos y los antecedentes patológicos. Asimismo, se encontró que elementos culturales como la educación, el lugar de nacimiento, el idioma y la profesión también intervinieron las decisiones de dejar el anticonceptivo. Además, se evidenció que factores sociales, tanto influencia de esposos y

padres, así como carencias de consejos adecuados, desempeñan un papel significativo en esta problemática. En conclusión, los factores mencionados anteriormente se localizan asociados a la dejadez de métodos anticonceptivos.

Lara S. (14) en el año 2021 efectuó un trabajo investigativo titulada “Factores asociados al abandono de métodos anticonceptivos en usuarias del centro de salud Faucett, Callao”, mediante un trabajo analítico no experimental, de casos y controles, transversal y retrospectivo. El grupo constituido fue 97 casos y 97 controles, se les administró una ficha de recolección de datos como instrumento. Estos hallazgos revelaron factores relacionados al dejadez de métodos anticonceptivos en dicha población. Entre factores sociodemográficos identificaron las edades, la educación básica, el estado civil de convivencia y el rol de ama de casa. Factores personales: obesidad, antecedentes de patología. En conclusión, las causas mencionadas incluyen al abandono de los métodos anticonceptivos según hallazgos de este estudio.

Silva K. (15) en el año 2020 en su investigación titulada “Factores de riesgo asociados al abandono de métodos anticonceptivos en mujeres”. Cuya metodología fue analítica de casos y controles, observacional, no experimental, corte transversal y retrospectivo, en donde recopilaron datos de 141 historias clínicas. Los resultados obtenidos revelaron los factores; como edad externa con 36.2%, la multiparidad estuvo presente en el 25.2% de los casos y el antecedente de patología se relaciona con el abandono en el 29.8% de los casos. En conclusión, las circunstancias de riesgos está relacionado al abandono de métodos anticonceptivos tuvieron antecedentes de patología, la multiparidad y la edad extrema, según los hallazgos de este estudio.

Gama N. (16) en el año 2018, desarrolló un estudio titulado: “Factores que influyeron en el abandono de métodos anticonceptivos en puérperas”, utilizó una metodología de caso-control. La muestra consistió en 190 pacientes que dejaron de utilizar anticonceptivos y 88 pacientes que continuaron con anticonceptivos, se aplicó un cuestionario para recopilar información. Los resultados obtenidos mostraron una asociación significativa entre los factores institucionales, factores individuales y factores

socioculturales con la dejadez de métodos anticonceptivos. Estos factores pueden incluir aspectos como la falta de apoyo institucional, la falta de información adecuada, las preferencias personales, las creencias culturales y las normas sociales. En conclusión, este estudio evidencia que los factores sí influyeron en el abandono de métodos anticonceptivos.

Duran R. (9) en el año 2018, sugirió un estudio titulada “Relación entre el abandono del método anticonceptivo hormonal y la característica general, clínica, personal y cultural de la usuaria y la característica institucional”, llevó a cabo un estudio correlacional, transversal, descriptivo y prospectivo, con 153 usuarias a las cuales aplicaron una encuesta. Como resultados obtenidos indica que existen factores relacionados de estas son: características generales, clínicas, institucionales. Concluyendo que las características de las usuarias y de la institución están asociadas al dejadez de anticonceptivos hormonales.

A nivel local

Flores A. Escalante M. (17) en el año 2022, desarrollaron una investigación titulada: “Factores de riesgo que influyen en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del P.S I-2 Taparachi-Juliaca”. Se empleó la metodología cuantitativa y no experimental de corte transversal, su población objetiva fue 109 mujeres seleccionadas mediante un muestreo no probabilístico, a quienes aplicaron un cuestionario. De tal manera revelaron varias causas de riesgo que influyeron la dejadez de los anticonceptivos. En primer lugar, se observó que el 55% de las mujeres desconocían dónde encontrar información sobre los encargados de planificación familiar, de de los cuales se identificó como un factor institucional relevante en dejar de utilizar los anticonceptivos. Asimismo, en cuanto al factor sociocultural, el 33,0% de las mujeres locales no estaban satisfechas con el encargado de salud reproductiva. Por otro lado, en relación a los factores personales, un 35,8% de las mujeres expresaron no tener responsabilidad de una gestación no planificada recayera exclusivamente en ellas. A partir de estos hallazgos, se concluyó

que los factores institucionales, socioculturales y personales desempeñan un papel significativo en el abandono de anticonceptivos.

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar los factores asociados en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar si los factores institucionales se asocian en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.
- Determinar si los factores socioculturales se asocian en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.
- Determinar si los factores personales se asocian en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 MARCO TEÓRICO

2.1.1 FACTORES ASOCIADOS AL ABANDONO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

2.1.1.1 Factores asociados

Son elementos que ejercen influencia en el desarrollo o manifestación de una situación, pudiendo contribuir a que esta se presente de forma positiva o negativa. En caso de abandono de los métodos anticonceptivos está asociado con diversos factores como: institucionales, socioculturales y personales (15).

Dimensiones de los factores asociados Factores institucionales

Es cuando las personas pueden obtener rápidamente servicios esenciales de alta calidad, adaptados a las necesidades específicas de sus comunidades, incluida la anticoncepción como parte de sus paquetes de atención a la salud reproductiva. Cabe destacar factores como el conocimiento por parte de los usuarios de los servicios anticonceptivos disponibles, la satisfacción de los usuarios con dichos servicios y la amplitud y profundidad de la atención ofrecida por los profesionales médicos (18).

Factores socioculturales

Se refiere a aquellos factores sociales y demográficos que con frecuencia tienen un impacto significativo en la decisión de dejar de utilizar técnicas anticonceptivas. Entre ellos se incluyen la ocupación, la educación, la religión, el idioma y las creencias (15).

El patrón cultural "machista", que es famoso en la sierra y la selva y, por tanto, muestra cualidades sociales diferentes a las de la zona costera, se transmite de padres a hijos e hijas a pesar de la gran variedad de contextos socioeconómicos y culturales en los que se crían los varones. Del mismo modo, es posible que algunas mujeres no tomen por sí mismas la decisión de utilizar anticonceptivos, sino que sean sus padres, amigos, familiares y, sobre todo, sus parejas quienes lo hagan por ellas. Se han descubierto varios conceptos y movimientos religiosos antiguos de Perú, y muchos de ellos advierten contra el uso de anticonceptivos (19).

Factores personales

Dado que son individualizados y suelen abarcar una variedad de patologías que el paciente ha padecido o padece desde la infancia hasta la actualidad, la edad, los efectos adversos, la paridad, los embarazos, el nivel socioeconómico, el nivel de conocimientos, los antecedentes patológicos y las ITS son algunos de los factores que suelen incluirse en ellos (15).

Los individuos se ven influidos por sus propios factores personales cuando se encuentran en un estado mental que les permite alterar sus acciones. Como resultado, existe una población con necesidades insatisfechas, la gran mayoría de las cuales no puede obtener una consulta por falta de tiempo, miedo o timidez hacia el profesional sanitario encargado de la atención, lo que contribuye a la incertidumbre general sobre la calidad de la atención y la eficacia del servicio de Planificación Familiar. Las mujeres, sin embargo, a menudo buscan información en otras personas, oyen rumores de amigos que pueden ser ciertos o no y, en última instancia, deciden no utilizar anticonceptivos debido a los efectos "negativos" para la salud, como dolores de cabeza, aumento o pérdida de peso, amenorrea, flujo menstrual irregular o prolongado y falta de deseo sexual (18).

2.1.2 MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

La Organización Mundial de la Salud, "un conjunto comportamiento que un individuo o una pareja desarrolla intencionalmente con el objetivo de prevenir el embarazo". Existen

diversas técnicas anticonceptivas disponibles, cada una con su propio periodo de uso recomendado, vía de administración, mecanismo de acción y nivel de eficacia (20). Estos métodos también engloban los procedimientos que las mujeres o sus parejas pueden utilizar para reducir la posibilidad de un embarazo no deseado. Los métodos anticonceptivos se pueden clasificar en categorías como hormonales, no hormonales, temporales, tecnológicos o conductuales, dependiendo de sus características específicas (4).

De lo expuesto se deduce que el método anticonceptivo óptimo es aquel en el que todas las mujeres, independientemente de su edad, salud, condiciones de vida o deseo de tener hijos en el futuro, son libres de seleccionar el método o métodos que prefieran para reducir sus posibilidades de experimentar un embarazo no deseado. Si se siguen correctamente, las estrategias seleccionadas pueden eliminar prácticamente la posibilidad de un embarazo no deseado. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Algunas mujeres pueden no sentirse satisfechas con los resultados de utilizar un método concreto, lo que puede provocar consecuencias no deseadas e incluso la resistencia de la pareja, razones adicionales por las que las mujeres dejan de tomar anticonceptivos (21).

Según la Organización Mundial de la Salud, el riesgo de quedarse embarazada es del 8% para las mujeres que no utilizan anticonceptivos y mantienen relaciones sexuales durante la fase fértil de su ciclo menstrual, frente al 1% de las que utilizan progestágenos y el 2% de las que utilizan AE con estrógenos (22).

2.1.2.1 Importancia de los métodos anticonceptivos

La Organización Mundial de la Salud, cuando las parejas tienen acceso a métodos anticonceptivos, tienen la opción de formar familias más pequeñas y/o espaciar más los embarazos. Un estudio adicional encontró que las mujeres que han dado a luz a cuatro o más hijos enfrentan un mayor riesgo de mortalidad materna debido a las probables complicaciones que pueden surgir durante la gestación y el parto (23).

2.1.2.2 Abandono de los métodos anticonceptivos

La "interrupción del método anticonceptivo" es el hecho de que una mujer deje de utilizar su método anticonceptivo por algún motivo. Esto puede estar relacionado con el método anticonceptivo en sí, con la persona o la pareja que lo utiliza, con el contexto en el que se utiliza o incluso con los propios proveedores (12).

2.1.3 PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Según la Organización Mundial de la Salud, la planificación familiar implica el establecimiento de prácticas que ayuden a las personas y a las parejas a retrasar o renunciar a tener hijos cuando y si no se desean, así como a fijar límites al número total de hijos que puede tener una familia (24). Algunas personas utilizan el término "planificación familiar" para describir un conjunto de medidas adoptadas por las parejas con el fin de regular su fertilidad y la maternidad (25).

2.2 MARCO CONCEPTUAL

- **Métodos:** Se refieren a la manera en la que una persona está acostumbrada a llevar a cabo una tarea o actividad. Esto implica el conjunto de acciones o pasos que se siguen para alcanzar un objetivo específico (26).
- **Factores:** Son características o condiciones inherentes a individuos o grupos que se relacionan con la posibilidad de generar un evento o causar un perjuicio al bienestar, como el abandono de los métodos anticonceptivos (4).
- **Anticonceptivo:** Cualquier estrategia o herramienta utilizada para prevenir embarazos no deseados se conoce como anticoncepción, contracepción o control de la natalidad (27).
- **Abandonó:** Se refiere a la acción de dejar de lado o descuidar algo o alguien que se considera como posesión o responsabilidad. Implica renunciar o dejar de atender a una persona, objeto o deber (28).
- **Planificación:** Se refiere al proceso de tomar decisiones con el fin de lograr un

futuro deseado, considerando la situación actual y los diversos factores centrales y exteriores que pueden influenciar en el logro de los objetivos (29).

2.3 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

2.3.1 HIPÓTESIS GENERAL

Los factores se asocian significativamente en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.

2.3.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

- Los factores institucionales se asocian significativamente en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.
- Los factores socioculturales se asocian significativamente en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.
- Los factores personales se asocian significativamente en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 ZONA DE ESTUDIO

Este estudio de indagación se llevó a cabo en el Centro de Salud I-3 Vallecito, el cual se ubica en el departamento de Puno, provincia y distrito de Puno, en el barrio Vallecito. Específicamente, se ubica en el Jirón Cancharani N°932, en una altitud de 3,900 metros sobre el nivel del mar, en las coordenadas geográficas aproximadas de -15.82941167° de latitud sur y -70.02054500° de longitud oeste. El ámbito jurisdiccional del centro de salud abarca 11 barrios y 3 comunidades, incluyendo la Universidad Nacional del Altiplano. Sus límites son los siguientes:

Al norte: Barrio Unión Llavini.

Al sur: Barrio La Unión y Pampa del Lago.

Al este: Universidad Nacional del Altiplano.

Al oeste: Barrio Bellavista y Machallata.

3.2 TAMAÑO DE MUESTRA

Población: Su población objetivo de este consistió de 400 mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito en la ciudad de Puno.

Muestra: Se describió la muestra mediante el muestreo probabilístico aleatorio simple, estuvo conformada por 197 mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito de la ciudad de Puno

Criterios de inclusión:

- Mujeres que manifiesten su voluntad de participar en este estudio.

- Mujeres que aprueben el consentimiento informado.
- Mujeres en edad fértil.
- Mujeres que hayan usado algún método anticonceptivo por lo menos una vez.
- Mujeres que hayan recibido atención en el Centro de Salud.

Criterios de exclusión:

- Mujeres que no desearon participar en el estudio.
- Mujeres que no aprueben el consentimiento informado.
- Mujeres que no se encuentren en edad fértil.
- Mujeres que no han usado algún método anticonceptivo.
- Mujeres que por diferentes motivos no pudieron completar la encuesta.

3.3 MÉTODO Y TÉCNICAS

Método: Deductivo.

Técnica: La encuesta.

Instrumento: Para ambas variables se empleó un cuestionario.

En primer lugar, se obtuvo un permiso de la institución correspondiente. Posteriormente, se llevaron a cabo los procedimientos administrativos necesarios con el jefe del Centro de Salud I-3 Vallecito, presentando una solicitud para así obtener un permiso y llevar a cabo la aplicación del cuestionario en las mujeres que acudían a dicho centro de salud. Una vez recopilada la información requerida, se procesó utilizando una hoja de cálculo en el programa Excel Windows 2017 y el software SPSS versión 25. Esto permitió generar gráficos y tablas estadísticas para realizar un análisis y proporcionar una explicación de los resultados.

Unidad de análisis

Credibilidad: A medida que se desarrolló el proyecto, se recopiló información en diversas fuentes bibliográficas para garantizar la credibilidad de los datos obtenidos. Estas fuentes incluyeron publicaciones académicas, repositorios, manuales y normas tecnológicas.

Transferibilidad: La selección del contenido recopilado se basó en un análisis de

síntesis, considerando su pertinencia para nuestra área de investigación. De esta manera, se buscó asegurar la transferibilidad de los hallazgos y su aplicabilidad en contextos similares.

La constancia interna: La investigación se desarrolló en un periodo de aproximadamente 3 meses, durante los cuales el investigador utilizó el conocimiento teórico para adquirir a lo largo de su formación profesional. Los instrumentos utilizados, fueron adaptados y validados para su aplicación en el estudio, y la información necesaria fue recopilada a través de encuestas.

La fiabilidad: El instrumento utilizado en el estudio fue sometido a un proceso de validación realizado por 3 expertos, y se evaluó su confiabilidad a través de pruebas de concordancia y binomial. Se determinó que el instrumento era confiable con un porcentaje del 87%, según el estudio realizado por Flores y Escalante en el año 2022 (30).

3.4 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES

3.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE

- Factores asociados

3.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE

- Abandono de métodos anticonceptivos

3.5 MÉTODO O DISEÑO ESTADÍSTICO

La investigación fue de tipo correlacional, porque se buscó determinar la relación entre los factores y el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres; de diseño no experimental, porque en ningún momento hubo manipulación de las variables y de corte transversal debido a que la información fue recolectada por única vez.

El análisis estadístico fue de tipo correlacional, esto permitió encontrar la relación entre las dos variables.

Para contrastar la hipótesis se usó el coeficiente de correlación Rho de Spearman cuadrada en confianza: 95% y un margen de error: 5%.

Esquema de operacionalización de variables

VARIABLE	TIPO DE VARIABLE	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	N° DE ITEMS	VALOR FINAL	CRITERIOS PARA ASIGNAR VALORES
Factores asociados	Independiente	La variable factores asociados en el abandono de métodos anticonceptivos será operacionalizada a través de un cuestionario, que está estructurado en función a las dimensiones, compuesto por 42 ítems en una escala tipo Likert.	Factores institucionales	Conocimiento sobre servicio de planificación familiar. Disponibilidad de métodos anticonceptivos. Calidad de atención al usuario.	13, 14, 15, 16, 17.	No Sí	MD: Muy en desacuerdo D: Desacuerdo I: Indeciso A: De acuerdo MA: Muy de acuerdo
			Factores socioculturales	Religión. Educación. Recursos económicos, desempleo. Influencia de la familia en el uso de métodos anticonceptivos. Influencia de la pareja en el uso de métodos anticonceptivos Influencia de los pares en el uso de métodos anticonceptivos Mitos sobre efectos de métodos anticonceptivo	18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.	Sí No	MD: Muy en desacuerdo D: Desacuerdo I: Indeciso A: De acuerdo MA: Muy de acuerdo
			Factores personales	Autocuidado Timidez Temor Tiempo	30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.	No Sí	MD: Muy en desacuerdo D: Desacuerdo I: Indeciso A: De acuerdo MA: Muy de acuerdo
Abandono de métodos anticonceptivos	Dependiente	La variable abandono de métodos anticonceptivos será operacionalizada a través de un cuestionario.	Abandono de método anticonceptivo No abandono de método anticonceptivo	Frecuencia del método anticonceptivo	12	Sí No	Casi nunca=1 Ocasionalmente=2 Casi siempre=3 Siempre=4

CAPÍTULO IV

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Tabla 01: Factores asociados en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.

Factores	Abandono de métodos anticonceptivos				Total	
	No		Si		N	%
	N	%	N	%		
No influye	44	22%	39	20%	83	42%
Si influye	0	0%	114	58%	114	58%
Total	44	22%	153	78%	197	100%




Figura 01: Factores asociados en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.

En la tabla N°01 y en el gráfico N°1, se puede observar que de las mujeres que no abandonaron los métodos anticonceptivos en el 22% los factores no influyeron; en aquellas mujeres que sí abandonaron los métodos anticonceptivos, en el 20% no influyeron los factores y en el 58% sí influyeron los factores.

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

Tabla 02: Relación entre factores y el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.

			Factores	Abandono de métodos anticonceptivos
Rho de Spearman	Factores	Coefficiente de correlación	1,000	,628**
		Sig. (bilateral)	.	,000
		N	197	197
	Abandono de métodos anticonceptivos	Coefficiente de correlación	,628**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	197	197

Fuente: elaboración propia.

HIPÓTESIS ALTERNA: Los factores se asocian significativamente en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.

HIPÓTESIS NULA: Los factores no se asocian significativamente en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.

En la tabla N°02, se puede observar que el valor "p" (0,000) es mínimo menor al nivel de significancia establecido (0,05). Por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna, entonces se considera que si existe una asociación significativa entre los factores y el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno en el año 2023.

Con estos resultados se demostró que existe asociación significativa entre los factores y el abandono de métodos anticonceptivos, un 58% de las mujeres tuvo influencia de los factores en el abandono de métodos anticonceptivos.

Según los hallazgos del estudio realizado por Gama N. (16), en Lima, se llegó a la

conclusión de que los factores en todas las dimensiones tuvieron un impacto en el abandono de métodos anticonceptivos. Asimismo, Durán R. (9), quien planteó relacionar el abandono del método anticonceptivo hormonal y las características de las usuarias en un Centro de Salud, encontrando una asociación significativa entre estas variables. De la misma manera Torres M. (12) en los resultados que encontró, se reveló que existen varios factores relacionados al abandono de métodos anticonceptivos, de los cuales resalta más los efectos adversos que estos causan; concluyendo que los factores sí influyeron en el uso de los métodos anticonceptivos. También Flores A. Escalante M. (17) señala que los factores institucionales como no conocer que el servicio de planificación familiar es el lugar donde pueden obtener información al respecto, socioculturales como que la pareja la puede obligar a no usarlos y personales como el embarazo, desempeñan un papel significativo en el abandono de anticonceptivos.

Como se sabe los factores sean internos o externos a una persona, siempre afectarán en el resultado esperado, en este caso las mujeres que abandonaron la continuación de los métodos anticonceptivos, a consecuencia de esto puede elevarse el índice de casos en embarazos no deseados, sobrepoblación, lo que conlleva a otros problemas más grandes.

Tabla 03: Factores institucionales se asocian en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.

Abandono de métodos anticonceptivos					Total	
Factores institucionales	No		Si		N	%
	N	%	N	%		
No influye	19	9%	41	21%	60	30%
Si influye	25	13%	112	57%	137	70%
Total	44	22%	153	78%	197	100%

Fuente: elaboración propia.




Figura 02: Factores institucionales se asocian en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.

Fuente: elaboración propia.

En la tabla N°03 y en el gráfico N°02, se puede observar que entre las mujeres que no abandonaron los métodos anticonceptivos, un 9% indicó que los factores personales no influyeron, mientras que un 13% afirmó que sí tuvieron influencia. En contraste, entre las

mujeres que sí abandonaron el método anticonceptivo, un 21% declaró que los factores no tuvieron influencia, mientras que un 57% indicó que sí jugaron un papel en su decisión.

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

Tabla 04: Relación entre factores institucionales y el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.

		Factores institucionales	Abandono de métodos anticonceptivos
Factores institucionales	Coefficiente de correlación	1,000	,148*
	Sig. (bilateral)	.	,038
Abandono de métodos anticonceptivos	Rho de Spearman	197	197
	Coefficiente de correlación	,148*	1,000
	Sig. (bilateral)	,038	.
	N	197	197

Fuente: elaboración propia.

HIPÓTESIS ALTERNA: Los factores institucionales se asocian significativamente con el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.

HIPÓTESIS NULA: Los factores institucionales no se asocian significativamente con el abandono de método anticonceptivo en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.

En la tabla N°04, se puede observar que el valor "p" (0,038) es mínimo menor al nivel de significancia establecido (0,05). Por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna, entonces se considera que si existe una asociación significativa entre los factores institucionales y el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del

Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno en el año 2023.

Con los resultados se demostró que existe asociación significativa entre los factores institucionales y abandono de métodos anticonceptivos, un 57% de las mujeres tuvo influencia de los factores institucionales en abandono de métodos anticonceptivos.

Esto concuerda con lo que encontraron, Thobani R. et. al. (11), quienes realizaron su estudio en Pakistán, encontraron que aspectos como experimentar efectos secundarios y obstáculos en acceder a los servicios de salud fueron factores que influyeron en el abandono de los métodos anticonceptivos. Además, Flores A. Escalante M. (17), en su investigación realizada en Juliaca, obtuvieron resultados similares, donde se observó que el 55% de las mujeres desconocían dónde encontrar información sobre planificación familiar y otras mujeres consideraban insuficiente el acercamiento al servicio de salud reproductiva. Y en el estudio de Gama N. (16) resaltó que el 87.3% de las mujeres que abandonaron los métodos anticonceptivos desconocía el horario de atención del servicio. En este aspecto se puede deber a que las mujeres del Centro de Salud Vallecito no están recibiendo una atención de calidad, se puede atribuir como causa de estos resultados al poco acceso y desinformación que reciben las mujeres usuarias de esta institución, como la disponibilidad de los servicios, horarios y tipo de métodos anticonceptivos.

Tabla 05: Factores socioculturales se asocian en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.

Abandono de métodos anticonceptivos					Total	
Factores socioculturales	No		Si		N	%
	N	%	N	%		
No influye	18	9%	32	16%	50	25%
Si influye	26	13%	121	62%	147	75%
Total	44	22%	153	78%	197	100%

Fuente: elaboración propia.




Figura 03: Factores socioculturales se asocian en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.

Fuente: elaboración propia.

En la tabla N°05 y gráfico N°03, los factores socioculturales no influyeron en mujeres que no abandonaron los métodos anticonceptivos el 9%, y un 16% de las que sí, los factores sí influyeron en el 13% de las que no abandonaron los métodos y en el 62% de las que sí abandonaron.

Tabla 06: Relación entre factores socioculturales y el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.

Factores socioculturales		Abandono de métodos anticonceptivos	
	Coefficiente de correlación	1,000	,191**
Factores socioculturales	Sig. (bilateral)	.	,007
Rho de Spearman	N	197	197
Abandono de métodos anticonceptivos	Coefficiente de correlación	,191**	1,000
	Sig. (bilateral)	,007	.
	N	197	197

Fuente: elaboración propia.

HIPÓTESIS ALTERNA: Los factores socioculturales se asocian significativamente en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.

HIPÓTESIS NULA: Los factores socioculturales no se asocian significativamente en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.

En la tabla N°06, se puede observar que el valor ($p < 0,007$) es mínimo el nivel de significancia (0.05), por esto se rechazaron la hipótesis nula y aceptaron la hipótesis alterna; entonces se encontró asociación significativa entre factores socioculturales en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.

En esta dimensión, se contempla que la mayoría de mujeres fueron influenciadas por factores socioculturales para abandonar métodos anticonceptivos. Los resultados se asemejan por Daza J. (10), en su trabajo de investigación realizado en Ecuador,

descubrió que los factores como la edad entre 15 y 25 años y las creencias relacionadas con la esterilidad están relacionados con abandono de métodos anticonceptivos. Igualmente, Colca M. (13), quién realizó una revisión de estudios previos, encontró que la educación, procedencia, idioma, la pareja, los padres, influyeron en la decisión de abandonar el método anticonceptivo. Lo mismo por parte de Lara S. (14) en el Callao, demostró que los factores sociodemográficos como la edad, educación, estado civil y ocupación sí influyeron en el interés de las mujeres en cuanto al abandono de método anticonceptivo. Silva K. (15) encontró que el estado civil prefieren utilizarlo las mujeres que viven con sus convivientes o son solteras, mientras que las casadas optaron por métodos de barrera.

Entonces podemos dar a entender que la mayoría de las mujeres es influenciada por la edad, religión, creencias, costumbres, otras personas y por la poca búsqueda de información, aspectos que se mantienen a pesar del desarrollo, globalización y modernización que se supone viene mejorando a nivel global.

Tabla 07: Factores personales se asocian en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.

Factores personales	Abandono de métodos anticonceptivos				Total	
	No		Si			
	N	%	N	%	N	%
No influye	21	10%	26	13%	47	23%
Si influye	23	12%	127	65%	150	77%
Total	44	22%	153	78%	197	100%

Fuente: elaboración propia.




Figura 04. Factores personales se asocian en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.

Fuente: elaboración propia

En la tabla N°07 y el gráfico N°04, los factores personales no influyeron en mujeres que no abandonaron el método anticonceptivo un 10%, y el 13% de las que sí, los factores sí influyeron en el 12% de las que no abandonaron los métodos e influyó en el 65% de las que sí lo abandonaron.

Tabla 08. Relación entre factores personales y el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.

			Factores personales	Abandono de métodos anticonceptivos
Rho de Spearman	Factores personales	Coeficiente de correlación	1,000	,300**
		Sig. (bilateral)	.	,000
		N	197	197
	Abandono de métodos anticonceptivos	Coeficiente de correlación	,300**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	197	197

Fuente: elaboración propia.

HIPÓTESIS ALTERNA: Los factores personales se asocian significativamente en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.

HIPÓTESIS NULA: Los factores personales no se asocian significativamente en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.

En la tabla N°08, se puede observar que el valor ($p < 0,000$) es mínimo al grado de significancia establecida (0.05), lo que nos lleva a rechazar la hipótesis nula y así aceptar hipótesis alterna. Por lo tanto, se concluye que existe una asociación significativa entre factores personales y el abandono de métodos anticonceptivos en las mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.

Se puede apreciar que en esta dimensión predomina el porcentaje de las mujeres a quienes los factores socioculturales influyen en el abandono de métodos anticonceptivos. Estos resultados pueden ser comparados con los de Torres M. (12) en Ecuador, los

efectos adversos, embarazo, la religión y otros factores influyeron en la decisión de mujeres en abandonar y utilizar los métodos anticonceptivos. También Colca M. (13) por su parte, encontró que los efectos secundarios, el embarazo, la cantidad de hijos y los antecedentes de patología fueron factores individuales que influyen en abandono de métodos anticonceptivos. Lara S. (14) también encontró una relación entre estos factores, la obesidad y los antecedentes de patología estaban asociados el abandono de métodos anticonceptivos. Finalmente, Silva K. (15), encontró que los factores asociados al abandono pertenecieron a la edad extrema, la multiparidad y los antecedentes de patología.

Lo que da a entender que las mujeres aún son conservadoras para hacer preguntas respecto al tema, prefieren hacer caso del dicho de otras personas (quienes no necesariamente comparten una información real), por lo tanto, tienen un conocimiento deficiente, o consideran que no tienen tiempo suficiente para mantener continuamente el método anticonceptivo. Asimismo, el temor a comprender algunos malestares o efectos secundarios del método anticonceptivo lo que conlleva al abandono.

CONCLUSIONES

PRIMERA: Existe correlación significativa entre factores y abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023. Sustentado estadísticamente con un valor de significancia (0,000) menor a 0,05.

SEGUNDA: Existe correlación significativa entre factores institucionales y el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023. Sustentado estadísticamente con un valor de significancia (0,038) menor a 0,05.

TERCERA: Existe correlación significativa entre los factores socioculturales y el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023. Sustentado estadísticamente con un valor de significancia (0,007) menor a 0,05.

CUARTA: Existe correlación significativa entre factores personales y el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023. Sustentado estadísticamente con un valor de significancia (0,000) menor a 0,05.

RECOMENDACIONES

AL JEFE DEL CENTRO DE SALUD I-3 VALLECITO, se recomienda admitir medidas indispensables para reducir la influencia de los factores institucionales en el abandono de los métodos anticonceptivos, capacitar, actualizar, etc., para sensibilizar al personal y aumentar la satisfacción de los pacientes.

A LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA QUE LABORAN EN EL CENTRO DE SALUD I-3 VALLECITO, empoderarse con temas respecto a lo estudiado, ya que las enfermeras son normalmente quienes figuran mayor parte del personal de una institución de salud, lo mejor es estar preparadas para cuando existan dudas de parte de las mujeres usuarias de este establecimiento, así poder responder y satisfacer a sus dudas.

A LOS BACHILLERES Y ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA, se recomienda realizar estudios de este tipo en sectores rurales especialmente en mujeres en edad vulnerable y que mejoraría la calidad de vida de muchas usuarias y de población en general.

BIBLIOGRAFÍA

1. Flores M. Factor asociado [Internet]. Guatemala; 2010 [citado 10 de mayo de 2023]. Disponible en: https://www.google.com/search?q=factor+asociado&rlz=1C1OKWM_esPE991PE991&ei=DxBcZMOIB4id5OUP1Ja06A0&ved=0ahUKEwiDzKqg3Ov-AhWIDrkGHVQLDd0Q4dUDCA8&uact=5&oq=factor+asociado&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6CggAEEcQ1gQQsAM6CggAEIoFELADEEM6DAgAEIoFEEMQRhD5AToHCAAQigUQQzoRCC4QgwEQxwEQsQMQ0QMQgAQ6EggAEIoFELEDEIMBEEMQRhD5AToNCAAQigUQsQMQgwEQQzoLCAAQgAQQsQM QgwE6CAgAEIAEELEDOgsILhCABBDHARCvAUoECEEYAFceC1iIK2DyM GgBcAF4AIABYYgB2gqSAQlxNZgBAKABAcgBCsABAQ&sc lient=gws-wiz-serp
2. Ministerio de Salud. Métodos anticonceptivos [Internet]. 2023 [citado 10 de mayo de 2023]. Disponible en: <https://www.gob.pe/21781-metodos-anticonceptivos>.
3. Ccahua Nina LK. Nivel de satisfacción sobre la atención de enfermería en madres de niños menores de 5 años. Servicio CRED, Puesto de Salud Huarcocondo – cusco, 2019. 2019;84. Disponible en: https://repositorio.uandina.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12557/3006/Lizbeht_Tesis_bachiller_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
4. Ministerio de Salud del Perú. Norma técnica de salud de planificación familiar. Bibl Cent del Minist Salud [Internet]. 2017;1:131. Disponible en: <http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4191.pdf>
5. Espinoza Y. Deserción de los métodos anticonceptivos de corta duración en

- madres de familia del puesto de salud Ramiro Priale Priale del distrito del tambo, 2018. Univ Peru del Cent [Internet]. 2018;165. Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1656/index1.html
6. Organización Mundial de la Salud (OMS). Un nuevo estudio de la OMS relaciona las altas tasas de embarazo no planificados con las deficiencias de los servicios de planificación familiar. 2019; Disponible en: <https://www.who.int/es/news/item/25-10-2019-high-rates-of-unintended-pregnancies-linked-to-gaps-in-family-planning-services-new-who-study>
 7. Guzmán J. Factores asociados al abandono de métodos de anticoncepción [Internet]. Universidad de San Carlos de Guatemala. 2017 [citado 27 de enero de 2023]. p. 466. Disponible en: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/05/05_10148.pdf
 8. INEI. Perú Encuesta Demográfica y de Salud familiar ENDES 2020 [Internet]. INEI. 2021 [citado 27 de enero de 2023]. p. 101-14. Disponible en: https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2020/INFORME_PRINCIPAL_2020/INFORME_PRINCIPAL_ENDES_2020.pdf
 9. Duran R. Relación entre el abandono del método anticonceptivo hormonal y la característica general, clínica, personal y cultural de la usuaria y la característica institucional centro de salud Collique III zona- Octubre 2016. Univ San Martín Porres [Internet]. 2018;73. Disponible en: https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/3649/duran_nrc.pdf?sequence=3&isAllowed=y
 10. Daza J. Factores asociados al abandono de métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértiles del Centro de Salud La Esperanza, Ecuador, 2021.

- Univ César Vallejo [Internet]. 2021;1-5. Disponible en:
<https://hdl.handle.net/20.500.12692/76522>
11. Thobani R, Jessani S, Azam I, Reza S, Sami N, Rozi S, et al. Factors associated with the discontinuation of modern methods of contraception in the low income areas of Sukh Initiative Karachi: A community-based case control study. PLoS One. 2019;14(7):1-12.
 12. Torres M. Factores asociados al abandono del método anticonceptivo hormonal por las mujeres de la parroquia El Valle de ciudad de Loja. Repos la UNL [Internet]. 2018; Disponible en:
<https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/20793/1/TESIS.pdf>
 13. Colca M. Factores asociados al abandono de los métodos anticonceptivos hormonales según evidencias en los años 2016-2021. [Internet]. Universidad Privada Nibert Wiener. 2021 [citado 27 de enero de 2023]. p. 0-1. Disponible en:
https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/6260/T061_46705323_T.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 14. Lara S. Factores asociados al abandono de métodos anticonceptivos en usuarias del centro de salud Faucett, Callao 2020. Repos USMP [Internet]. 2021;44. Disponible en:
https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/8772/Lara_RSI.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 15. Silva K. Factores de riesgo asociados al abandono de métodos anticonceptivos en mujeres atendidas en el Hospital Nacional Hipólito Unánue, 2019. [Internet]. Vol. 53, Journal of Chemical Information and Modeling. 2020. p. 1689-99. Disponible en:
<https://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13084/4366/SILV A>

16. Gama N. Factores que influyeron en el abandono de métodos anticonceptivos en puérperas, atendidas en el Hospital San Juan de Lurigancho, noviembre - diciembre del 2017. Univ Nac Mayor San Marcos [Internet]. 2018;1-70. Disponible en: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/4733/Gama_cn.pdf?sequence=3
17. Flores A, Escalante M. Factores de riesgo que influyen en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del P.S I-2 Tarapachi-Juliaca, 2022. Universidad Roosevelt. 2022. p. 107.
18. Schwarcz R, Castro R, Galimberti D, Martínez I, García O, Lomuto C, et al. Guía para el uso de métodos anticonceptivos. Minist Salud la Nación [Internet]. 2002;68. Disponible en: <http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/GUIA>
19. Ramirez MI, Vivanco LM. Factores que influyen en el abandono de métodos anticonceptivos de larga duración en usuarias atendidas en consulta externa de planificación familiar en el hospital María Auxiliadora en el periodo de enero - marzo, 2018 [Internet]. Universidad Norbert Wiener. Universidad Norbert Wiener; 2018 [citado 22 de diciembre de 2022]. Disponible en: https://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13053/2910/TESIS_Ramirez_Marsha_-_Vivanco_Lucia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
20. Kantorová V, Wheldon MC, Ueffing P, Dasgupta ANZ. Estimating progress towards meeting women's contraceptive needs in 185 countries: A Bayesian hierarchical modelling study. PLoS Med [Internet]. 2020;17(2):1-23. Disponible en: <https://journals.plos.org/plosmedicine/article/file?id=10.1371/journal.pmed>

- .1003026&type=printable
21. Barrera-Coello L, Olvera-Rodríguez V, Castelo-Branco C, De M, Cancelo-Hidalgo J. Causas de desapego a los métodos anticonceptivos. Ginecol Obstet Mex [Internet]. 2020;88(1):88-95. Disponible en: <https://doi.org/10.24245/gom.v88i->
 22. Acevedo-Osorio GO, Ramírez-García N, Cardona-Osorio JD, Oliveros- Ruiz C. Conocimiento y uso de método anticonceptivo de emergencia en estudiantes universitarios, Pereira, Colombia. Univ y Salud [Internet]. 2019;21(2):159-65.
 23. Organización Mundial de la Salud. La OMS resalta la importancia del acceso a anticonceptivos [Internet]. 2014 [citado 10 de mayo de 2023]. Disponible en: <https://news.un.org/es/story/2014/03/1295971>
 24. Passah MC. Influence of Sociodemographic Factors on the Utilization of Contraceptive Methods Among the Married Women of Jowai Town, West Jaintia Hills District, Meghalaya. Orient Anthropol [Internet]. 2020;20(1):181-93. Disponible en: <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0972558X20913726>
 25. Castrejón N. Estrategia educativa para potenciar el conocimiento y uso de métodos de planificación familiar de los alumnos del 1er. semestre de la preparatoria no. 10 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). Molecules [Internet]. 2020;2(1):1-12. Disponible en: <http://clik.dva.gov.au/rehabilitation-library/1-introduction-rehabilitation%0Ahttp://www.scirp.org/journal/doi.aspx?DOI=10.4236/as.2017.81005%0Ahttp://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?DOI=10.4236/as.2012.34066%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.pbi.201>
 26. Fernandez C. Métodos anticonceptivos. Minist salud [Internet]. 2015;

- Disponible en: <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
27. Orellana A, Diezma J, Lasheras L, Pires M. Los métodos anticonceptivos [Internet]. Salud Madrid. 2013 [citado 16 de febrero de 2023]. p. 1-29. Disponible en: <https://www.scielo.org.mx/pdf/gom/v87n8/0300-9041-gom-87-08-499.pdf>
28. Niño C, Vargas L, González N. Dropout, change or therapeutic failure to hormonal contraception in university women. Ginecol Obstet Mex [Internet]. 2019;87:499-505. Disponible en: <https://www.scielo.org.mx/pdf/gom/v87n8/0300-9041-gom-87-08-499.pdf>
29. Gallardo E. Fundamentos de planificación. Enfoques Adm [Internet]. 2012;5:1-33. Disponible en: [http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/32363/1/Fundamentos de planificación.pdf](http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/32363/1/Fundamentos%20de%20planificaci%C3%B3n.pdf)
30. Flores A, Escalante M. Factores de riesgo que influyen en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del P.S I-2 Taparachi - Juliaca. [Tesis para optar el título de licenciada en Enfermería]: Huancayo: Universidad Roosevelt; 2022

ANEXOS

Anexo 01: Matriz de consistencia

PROBLEMA GENERAL	OBJETIVO GENERAL	HIPÓTESIS	VARIABLE	DIMENSIÓN	METODOLÓGICA
¿Cuáles son los factores asociados en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023?	Determinar los factores asociados en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.	Los factores se asocian significativamente en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno- 2023.	Variable 1 Factores asociados	Factores institucionales Factores socioculturales Factores personales	Enfoque: Cuantitativo Tipo: Básica Nivel de estudio: Correlacional Diseño: No experimental - de corte transversal Población: Estuvo conformada por 400 mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito.
PROBLEMAS ESPECÍFICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	HIPÓTESIS ESPECÍFICAS	Variable 2 Abandono de métodos anticonceptivos	Abandono de método anticonceptivo No abandono de método anticonceptivo	Muestra: El total de la muestra fue de 197 mujeres. Muestreo: De tipo probabilístico aleatorio simple. Técnica e instrumento:
¿Cuáles son los factores institucionales asociados en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023?	Determinar si los factores institucionales se asocian en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.	Los factores institucionales se asocian significativamente en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno- 2023.			
¿Cuáles son los factores socioculturales asociados en el abandono de métodos anticonceptivos	Determinar si Los	Los factores socioculturales se asocian significativamente en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres			

<p>en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023? ¿Cuáles son los factores personales asociados en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023?</p>	<p>factores socioculturales se asocian en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023. Determinar si los factores personales se asocian en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno-2023.</p>	<p>del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno- 2023. Los factores personales se asocian significativamente en el abandono de métodos anticonceptivos en mujeres del Centro de Salud I-3 Vallecito, Puno- 2023.</p>	<p>Técnica: Encuesta Instrumento: Para ambas variables se empleó un cuestionario. Técnica de análisis de datos Toda la información se procesó en el programa estadístico SPSS versión 22, para el procesamiento estadístico de la información. En este proceso se realizó la prueba de normalidad de Kolmogorov Smimov, al tratarse de una muestra superior a 50.</p>
--	---	---	--

Anexo 02: Instrumento

**FACTORES ASOCIADOS EN EL ABANDONO DE MÉTODOS
ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES DEL CENTRO DE SALUD I-3
VALLECITO, PUNO-2023.**

Fecha: _____

Instrucciones: Marque con "X" la respuesta que usted considere correcta.

Datos generales:

VARIABLES	INDICADOR	CODIFICAR
1. Edad	_____ años	
2. Grado de instrucción:	Analfabeta	1
	Primaria	2
	Secundaria	3
	Superior no universitario	4
	Superior Universitario	5
3. Estado Civil:	Soltera	1
	Casada	2
	Conviviente	3
	Divorciada o separada	4
	Viuda	5
4. Religión:	católico	1
	Evangelista	2
	Testigo de Jehová	3
	Cristiano	4
	Otra _____	5
5. Ocupación:	Ama de casa	1
	Estudiante	2
	Comerciante	3
	Otra _____	4
6. Número de hijos:	_____	
7. Número de abortos:	_____	
8. Número de parejas sexuales:	_____	
9. Edad de Inicio de relaciones sexuales:	_____	

10. ¿Ud. ¿Utilizó algún tipo de método anticonceptivo?	SI	1
	NO	2
11. ¿Qué método anticonceptivo utiliza?		
	Casi nunca	1
12. ¿Con qué frecuencia ha utilizado los métodos	Ocasionalmente	2

anticonceptivos antes de este embarazo?	Casi siempre	3
	Siempre	4

Factores Institucionales:

Marque en SÍ o NO, según sea la respuesta que usted considere.

	SI	NO
13. ¿Ud. tenía conocimiento que el C.S I-3 Vallecito cuenta con el servicio de Planificación Familiar?		
14. ¿Ud. tenía conocimiento que el C.S I-3 Vallecito ofrece métodos anticonceptivos de forma gratuita?		
15. ¿Ud. tenía conocimiento que el consultorio de Planificación familiar se encuentra disponible de lunes a sábado en los turnos mañana y tarde?		
16. ¿Los métodos de Planificación Familiar que ofrecen en el C.S. I-3 Vallecito satisfacía su necesidad?		

Marque con un aspa "X" la respuesta que considere acertada con su punto de vista, según las siguientes alternativas:

MD: Muy en desacuerdo D: Desacuerdo I: Indeciso A: De acuerdo MA: Muy de acuerdo

	MD	D	I	A	MA
17. De acuerdo a su atención recibida en el consultorio de Planificación familiar por el personal de Obstetricia considera que:					
a. ¿El personal de Obstetricia fue discreto, confiable?					
b. ¿El personal identificó correctamente su necesidad de métodos anticonceptivos?					
c. ¿El personal respondió satisfactoriamente a sus necesidades, dudas, etc.?					
d. ¿El personal verificó que usted haya comprendido toda la información referente al método anticonceptivo que eligió?					
e. ¿El personal mantuvo en todo momento una actitud respetuosa y cordial?					

Factores Socioculturales:

Marque con un aspa "X" la respuesta que considere acertada con su punto de vista, según las siguientes alternativas:

MD: Muy en desacuerdo D: Desacuerdo I: Indeciso A: De acuerdo MA: Muy de acuerdo

	MD	D	I	A	MA
18. ¿Usted cree que su educación influyó en su decisión de no usar métodos anticonceptivos?					
19. ¿En su familia se habló de métodos anticonceptivos?					
20. ¿Piensa que la información de métodos anticonceptivos en su Distrito fue buena?					
21. ¿Ud. ¿Utilizó algún medio de comunicación para informarse sobre los métodos anticonceptivos?					
22. ¿Ud. creía que la utilización de métodos anticonceptivos era pecado?					
23. ¿Su religión le permitió a usted utilizar métodos de Planificación Familiar?					
24. ¿Según Ud., su pareja tenía derecho a prohibirle que use métodos anticonceptivos?					
25. ¿Usted creía que la mujer no debe planificar, porque su deber es darle hijos a su marido?					
26. ¿Se sintió afectada su decisión para el abandono del método anticonceptivo, por los conocimientos que le han transmitido sus familiares?					
27. ¿Se sintió afectada su decisión para el abandono del método anticonceptivo, por los conocimientos que le han transmitido sus amigos?					
28. ¿Ud. Contó con los medios suficientes de transporte y economía para acudir a sus citas en el consultorio de Planificación Familiar para la adquisición de su método anticonceptivo?					
29. ¿En algún momento usted escuchó de algún miembro de la sociedad que el uso de un método anticonceptivo de alguna u otra manera dañaría su salud, y por ello lo dejó?					

Factores Personales:

Marque con un aspa "X" la respuesta que considere acertada con su punto de vista, según las siguientes alternativas:

MD: Muy en desacuerdo D: Desacuerdo I: Indeciso A: De acuerdo MA: Muy de acuerdo

	MD	D	I	A	MA
30. ¿Consideraba usted que los conocimientos que tenía sobre los métodos anticonceptivos eran suficientes?					
31. ¿A usted le daba vergüenza consultar al personal de Obstetricia alguna duda sobre los métodos anticonceptivos?					
32. ¿Ud. Percibió algún malestar o efecto secundario del método anticonceptivo que haya provocado que lo dejara de utilizar?					
33. ¿Según usted, siempre había un tiempo o momento suficiente para el uso de un método anticonceptivo?					
34. ¿Ud. Consideraba que utilizar métodos anticonceptivos es importante?					
35. ¿Ud. Creía que la responsabilidad de su embarazo no planificado fue suyo?					
36. ¿Ud. Creía que la responsabilidad de su embarazo no planificado fue de su pareja?					
37. ¿Ud. Creía que la responsabilidad de su embarazo no planificado fue de la institución?					

Anexo 03: Consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO (PARA MAYORES DE EDAD)

TÍTULO DE INVESTIGACIÓN:

.....
.....

BREVE DESCRIPCIÓN:

.....
..... La participación en este estudio es completamente Voluntaria y Confidencial.

La información que nos proporcione será manejada confidencialmente, pues solo los investigadores tendrán acceso a esta información, por tanto, será protegida.

La aplicación del instrumento tiene una duración aproximada de minutos y consiste en resolver un con una serie de preguntas acerca de dicha información será analizada por el investigador de la rama.

DECLARACIONES:

Declaró mediante este documento que he sido informado plenamente sobre el trabajo de investigación, así mismo se me informó del objetivo del estudio y sus beneficios, para mí.

En consecuencia, doy mi consentimiento para la participación en el estudio descrito:

.....
Nombre del participante

.....
Firma

.....
Nombre del investigador

.....
Firma

36	31	3	3	1	1	2	0	1	25	2in...	3	2	2	1	1	4	5	5	1	2	2	4	1	4	1	1	1	4	1	14	2	4	2	4	2	4	2	4	2	5	2	4	5	1	4	4	1	1	2	13	2					
37	25	5	3	1	2	1	0	1	18	1in...	3	2	2	1	2	1	4	4	4	2	4	1	3	2	4	1	2	1	4	2	2	4	15	2	4	2	4	2	4	2	4	2	5	1	4	2	1	2	15	1						
38	36	3	4	1	3	4	0	1	23	2i...	2	2	2	1	1	3	4	3	5	4	1	3	2	2	1	1	4	1	1	5	2	1	3	2	5	7	2	4	2	4	2	5	2	5	1	4	4	1	2	14	1					
39	23	3	3	1	1	1	1	1	17	1in...	2	2	2	1	2	3	3	3	4	4	1	2	2	4	1	2	4	2	4	2	4	1	17	2	4	2	4	2	4	2	5	2	3	5	1	4	4	1	2	14	1					
40	19	4	1	1	2	1	0	1	18	1pi...	2	2	2	1	2	4	5	5	5	1	3	2	4	1	1	1	5	2	1	2	1	5	2	1	3	2	5	2	4	2	1	1	4	5	1	4	4	1	2	12	2					
41	35	3	3	1	1	3	0	1	18	1in...	3	2	2	1	2	4	4	4	4	4	1	4	1	2	4	2	4	2	4	2	4	1	17	2	4	2	4	2	4	2	5	2	4	5	1	4	2	1	2	14	1					
42	40	2	3	1	1	1	1	1	23	2i...	2	2	2	1	1	4	4	4	4	3	2	2	2	2	2	1	2	4	2	2	1	4	2	4	1	4	2	0	1	4	2	5	2	4	5	1	4	4	1	2	13	2				
43	37	4	4	1	4	3	0	2	19	1pi...	2	2	2	1	2	4	4	4	4	4	1	4	1	4	1	2	1	4	1	1	4	2	1	1	3	15	2	4	2	4	2	3	1	2	5	1	4	4	1	2	13	2				
44	24	3	3	1	1	1	1	1	20	2pi...	2	1	1	1	1	4	4	4	4	2	4	1	4	1	2	2	1	4	2	1	4	2	1	3	2	15	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	5	1	4	4	1	2	13	2		
45	43	2	3	1	1	2	0	1	18	1T...	4	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	1	4	2	1	4	2	1	4	1	16	2	4	2	4	2	2	1	3	5	1	4	4	1	2	13	2					
46	45	2	4	1	4	1	0	1	16	1pi...	3	1	2	2	2	4	3	4	2	4	1	4	1	4	1	2	1	4	2	1	1	4	2	2	1	3	2	15	2	4	2	4	2	4	2	4	5	1	4	2	1	2	14	1		
47	28	4	3	1	1	2	0	1	17	2in...	3	1	1	1	1	4	3	3	4	2	2	2	2	2	2	1	4	2	1	4	2	4	2	4	2	0	1	4	2	4	2	4	2	3	2	4	2	3	5	1	4	2	1	2	15	1
48	30	4	2	2	4	1	0	1	29	2pi...	2	2	2	1	2	4	3	4	4	4	1	3	2	2	2	1	3	2	1	4	2	4	2	3	2	4	19	1	4	2	4	2	4	2	4	2	4	5	1	4	2	1	2	14	1	
49	37	3	2	1	1	4	2	2	18	2i...	4	2	2	1	2	5	5	5	4	4	1	5	1	4	1	2	1	4	2	1	4	2	4	1	16	2	4	2	4	2	4	2	5	2	2	5	1	4	4	1	2	14	1			
50	24	3	3	1	1	2	0	2	16	2i...	3	2	2	1	2	4	4	4	4	4	1	4	1	4	1	2	1	4	2	1	4	2	1	4	16	2	4	2	4	2	2	1	4	2	2	1	3	5	1	4	4	1	2	12	2	
51	26	4	1	1	1	1	0	1	21	2in...	3	2	2	2	2	4	4	4	4	2	4	1	3	2	4	1	2	1	4	2	1	4	2	4	1	15	2	4	2	2	1	5	2	2	4	1	4	4	1	2	13	2				
52	27	5	3	1	1	1	0	1	20	2in...	3	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	4	2	1	4	2	4	2	4	1	17	2	4	2	2	1	4	2	4	2	2	2	2	2	2	13	2				
53	25	3	1	1	1	1	0	2	20	2in...	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	1	4	1	4	1	4	2	4	2	1	4	2	4	2	5	17	2	4	2	2	1	5	2	2	2	2	2	2	2	1	2	14	1			
54	30	5	3	1	2	1	0	1	23	1pi...	3	1	1	1	1	2	2	4	5	3	2	3	2	2	1	4	2	1	4	2	1	4	2	4	1	16	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	2	4	1	3	2	14	1		
55	41	3	3	1	1	3	1	3	18	2in...	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2	3	2	2	2	1	4	2	1	4	2	1	4	2	4	16	2	4	2	4	2	2	1	4	2	4	1	2	2	1	2	12	2			
56	19	3	1	1	1	1	1	1	17	1pi...	3	2	2	1	4	4	4	4	4	4	1	3	2	2	2	1	4	2	1	4	2	4	2	4	1	15	2	4	2	2	1	5	2	2	4	1	4	4	1	2	14	1				
57	30	5	2	4	1	1	0	1	25	1pi...	2	2	2	1	1	4	4	4	4	4	3	2	4	1	4	2	5	2	5	2	4	2	4	1	4	21	1	4	2	2	1	4	2	4	2	2	2	2	2	2	2	13	2			
58	21	3	3	1	1	1	1	2	17	1in...	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	1	4	1	4	1	4	2	5	2	4	2	4	2	3	2	4	19	1	4	2	5	2	4	2	4	2	4	1	2	14	1					
59	30	4	3	1	4	1	0	2	24	1in...	3	1	2	1	1	4	4	4	4	4	1	4	1	4	1	4	2	5	2	4	2	4	1	4	19	1	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	2	2	2	1	2	15	1			
60	35	3	3	1	1	1	4	3	18	1in...	2	2	2	1	1	4	4	4	4	4	1	4	1	4	1	4	2	5	2	4	2	4	1	4	19	1	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	1	2	14	1					
61	42	2	3	1	3	3	0	1	16	1t...	4	2	2	1	1	4	4	4	4	4	1	4	1	2	4	2	2	4	2	5	2	4	2	3	2	21	1	4	2	2	1	5	2	2	4	1	2	4	1	2	14	1				
62	33	4	3	1	1	2	1	1	21	1in...	3	2	2	1	1	4	4	4	4	4	1	2	2	4	1	4	2	5	2	4	2	4	1	5	20	1	4	2	4	2	5	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	15	1			
63	32	4	2	1	1	3	0	3	15	1pi...	2	2	2	1	1	2	4	4	4	4	3	2	4	1	2	4	2	5	2	4	2	4	1	4	21	1	4	2	2	1	4	2	4	2	4	2	4	1	2	13	2					
64	22	2	3	2	1	1	0	2	17	1pi...	2	2	2	1	1	4	4	4	4	4	2	2	4	1	4	2	5	2	4	2	4	1	4	21	1	4	2	2	1	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	14	1		
65	32	4	3	1	3	1	0	1	25	1in...	3	2	2	1	1	2	4	4	4	4	1	3	2	4	1	4	2	5	2	2	1	4	2	3	2	4	20	1	4	2	2	1	4	2	2	2	2	2	2	1	2	14	1			
66	23	4	3	1	1	1	0	2	20	1in...	2	1	2	1	1	4	4	4	4	4	2	4	1	3	2	2	4	2	5	2	4	2	3	2	21	1	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	2	2	2	1	2	14	1			
67	26	4	3	1	1	2	0	3	16	1pi...	2	1	2	1	2	3	3	4	4	3	2	3	2	4	1	4	2	5	2	5	2	5	2	22	1	4	2	5	2	4	2	4	2	4	2	4	1	2	14	1						
68	44	3	3	1	3	2	0	2	20	2in...	3	2	2	1	1	4	4	4	4	4	2	4	1	3	2	2	4	2	5	2	2	1	2	3	5	19	1	4	2	3	1	3	2	2	2	2	2	2	2	1	2	13	2			
69	30	3	1	1	1	1	0	3	17	1pi...	3	2	2	1	1	4	4	4	4	4	1	4	1	2	2	4	2	5	2	4	2	4	2	2	4	21	1	4	2	2	1	5	2	4	2	4	1	2	13	2						
70	39	2	3	1	1	2	1	2	23	2in...	1	2	2	1	2	4	4	4	4	4	5	1	5	1	4	2	2	5	2	4	2	2	1	4	19	1	4	2	2	1	4	2	4	2	2	2	2	2	2	2	1	2	13	2		

106	19	3	3	1	1	1	1	4	4	4	4	2	4	1	4	1	2	1	2	1	2	1	2	1	3	2	5	13	2	2	1	4	2	5	2	4	4	1	2	2	2	1	2	12	2		
107	24	3	3	1	2	2	1	3	3	4	2	4	1	3	2	4	1	2	1	4	2	1	2	1	4	2	2	4	15	2	2	1	4	2	4	2	4	4	1	1	1	2	2	2	12	2	
108	27	4	1	1	2	1	0	1	3	4	4	1	3	2	3	2	2	1	4	2	1	2	1	4	2	4	1	5	16	2	2	1	2	1	5	2	3	4	1	4	4	1	2	12	2		
109	30	3	2	1	3	3	0	2	2	4	4	2	4	1	2	2	2	1	4	2	1	1	4	2	4	2	4	1	2	17	2	2	1	2	1	2	1	3	4	1	2	2	1	2	11	2	
110	27	4	1	1	1	1	0	1	2	2	1	3	3	2	4	1	4	1	2	1	1	2	1	1	2	1	4	1	3	13	2	2	1	4	2	4	2	3	4	1	4	1	2	2	13	2	
111	20	3	3	1	1	1	0	1	2	2	4	4	4	2	4	1	4	1	4	2	1	2	1	2	1	2	1	3	2	4	13	2	2	1	2	1	4	1	4	1	4	1	2	10	2		
112	34	2	1	1	1	1	0	4	19	2	1	3	3	4	5	4	1	4	1	2	1	4	2	1	2	1	3	2	2	15	2	2	1	2	1	4	1	4	1	2	2	1	2	10	2		
113	40	2	3	1	1	3	1	2	21	2	2	2	4	4	4	2	2	4	1	2	1	2	1	2	1	3	2	5	15	2	2	1	4	2	5	2	4	2	2	2	1	2	13	2			
114	35	3	1	1	1	2	1	2	21	2	2	2	4	4	4	2	4	1	4	1	2	2	1	4	2	2	1	4	14	2	4	2	2	1	5	2	4	4	1	4	1	1	2	12	2		
115	40	5	3	1	1	1	0	4	19	2	1	1	4	4	4	4	1	4	1	2	1	2	1	2	1	2	2	5	14	2	2	1	4	2	5	2	2	4	1	2	2	1	2	13	2		
116	21	3	3	1	4	1	0	3	16	2	2	1	4	4	4	1	4	1	4	1	2	1	2	1	2	1	4	1	4	12	2	4	2	2	1	2	1	4	1	4	1	2	11	2			
117	33	3	3	2	1	1	0	1	29	2	2	1	1	4	4	1	4	1	2	2	2	3	1	4	2	1	4	2	2	4	17	2	2	1	4	2	2	4	1	2	2	1	2	12	2		
118	29	4	3	4	4	2	0	1	20	2	2	1	1	4	4	4	5	1	3	2	1	2	1	1	1	1	4	2	4	17	2	4	2	2	1	2	1	5	4	1	4	1	2	11	2		
119	30	3	3	4	1	3	1	1	17	2	2	1	1	4	4	4	3	2	4	1	2	4	2	2	1	4	2	4	1	5	19	1	2	1	4	2	6	2	4	1	4	1	1	2	12	2	
120	33	3	3	1	1	3	0	1	16	2	1	1	3	4	4	2	3	2	3	2	1	4	2	1	4	2	4	1	5	17	2	2	1	2	1	4	2	4	1	4	1	4	1	2	11	2	
121	21	4	1	1	2	1	0	2	16	2	2	1	1	3	4	4	2	4	1	2	4	1	2	1	4	2	4	3	2	17	2	2	1	5	2	1	3	2	5	1	1	2	13	2			
122	27	3	3	1	1	1	0	3	15	2	2	1	1	4	4	4	2	3	2	4	1	4	1	2	1	4	2	2	15	2	2	1	4	2	5	2	4	2	4	1	4	1	2	13	2		
123	29	3	3	1	1	3	0	1	18	2	1	1	2	4	4	4	2	2	3	2	4	1	2	1	5	1	1	1	2	2	17	2	2	1	2	1	5	2	2	4	1	4	1	2	12	2	
124	25	4	3	1	1	1	0	1	16	2	2	1	2	2	4	4	4	2	4	1	2	4	1	2	1	4	2	2	4	15	2	2	1	4	2	5	2	3	4	1	2	2	1	2	13	2	
125	24	5	3	1	2	1	1	1	20	2	2	2	1	3	4	4	1	4	1	4	1	2	1	4	2	1	4	2	2	4	14	2	4	2	5	2	5	2	4	1	4	1	2	13	2		
126	42	3	3	1	1	1	2	1	18	2	1	2	3	2	4	5	4	1	4	1	1	5	2	1	1	4	2	1	2	4	15	2	2	1	2	1	4	2	4	1	2	2	2	11	2		
127	21	4	3	4	1	1	0	1	19	2	2	1	1	4	4	4	5	1	2	4	1	4	1	4	2	3	2	1	3	4	17	2	4	2	2	1	4	2	2	1	4	2	1	2	13	2	
128	26	3	3	1	1	3	0	1	17	2	2	1	2	4	4	4	1	4	1	2	4	1	2	1	4	3	1	2	4	15	2	4	2	1	4	2	4	1	2	2	4	1	2	2	13	2	
129	41	3	3	1	1	3	0	1	18	1	2	2	2	4	4	4	2	4	1	4	1	2	1	4	2	1	4	2	1	5	13	2	4	2	4	2	4	2	3	4	1	4	1	2	14	1	
130	23	5	1	1	2	1	0	1	22	2	2	1	2	4	4	4	2	4	1	4	1	2	1	4	2	1	4	2	4	1	14	2	4	2	1	4	2	4	1	2	2	1	2	12	2		
131	30	4	3	1	1	1	0	1	26	2	2	1	1	3	4	4	2	4	1	4	1	2	1	4	2	1	4	1	5	12	2	2	1	2	1	4	2	2	4	1	4	1	2	12	2		
132	30	4	3	1	1	1	0	1	25	2	1	1	1	4	4	4	2	3	2	2	4	1	2	1	4	2	1	4	14	2	2	1	2	1	4	2	4	1	2	2	1	2	11	2			
133	19	3	3	1	2	1	0	2	16	2	2	1	1	4	4	4	2	4	1	4	1	4	2	1	4	2	1	2	2	4	13	2	2	1	4	2	4	1	4	1	2	2	1	2	12	2	
134	34	4	3	1	1	2	0	2	16	2	2	1	1	4	4	4	2	4	1	2	4	1	2	1	4	2	1	2	4	14	2	2	1	4	2	5	2	4	1	1	2	1	2	12	2		
135	28	5	1	1	4	1	0	3	14	2	2	1	1	3	4	3	4	1	5	1	2	2	1	4	2	1	2	5	15	2	2	1	2	1	4	2	4	1	2	2	1	2	12	2			
136	28	3	1	1	4	1	0	1	23	2	2	1	1	4	3	4	2	4	1	2	2	2	1	4	2	1	4	1	4	14	2	2	1	4	2	4	2	4	1	1	2	1	2	12	2		
137	36	3	3	1	1	3	0	1	19	1	2	1	1	3	3	4	2	4	1	4	1	2	2	1	4	2	4	3	2	4	16	2	2	1	4	2	6	2	3	4	1	2	2	1	2	13	2
138	34	3	3	1	1	2	0	1	17	2	2	1	1	4	4	4	2	4	1	2	1	2	1	5	1	1	1	4	1	5	14	2	2	1	2	1	3	5	1	5	1	1	2	11	2		
139	37	4	2	1	4	2	1	1	20	1	2	1	1	4	4	4	2	4	1	4	1	2	1	4	2	1	2	2	4	13	2	4	2	2	1	4	2	4	1	2	2	1	2	12	2		
140	32	4	3	1	4	1	0	1	23	1	2	1	1	3	4	2	4	1	3	2	4	1	2	1	4	2	1	4	2	4	1	5	15	2	2	1	2	1	4	1	2	2	1	2	10	2	

Anexo 05: Autorización del Centro de Salud I-3 Vallecito

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

SOLICITO: acceso a la institución para ejecutar
proyecto de tesis.

JEFE DEL CENTRO DE SALUD VALLECITO – PUNO

YO, **FLORA QUISPE TICONA**, Bachiller en enfermería, de la Universidad Privada San Carlos – puno, identificada con D.N.I. N° 70238291, domicilio Jr. kaluyo S/N Barrio vallecito del Departamento de Puno: Ante Ud. con el debido respeto me presento y expongo lo siguiente:

Que, en calidad de tesista de la facultad de enfermería, y habiendo aprobado mi proyecto de investigación titulado, **FACTORES ASOCIADOS EN EL ABANDONO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES DEL CENTRO DE SALUD VALLECITO I-3**, investigación que se va desarrollar para obtener el grado de título profesional de Licenciada en Enfermería; solicito a su persona acceso a la institución-centro de salud vallecito, con la finalidad de ejecutar proyecto de investigación. El cual consiste en realizar encuestas a las usuarias de la dicha institución, le expreso mi gratitud por su comprensión y amabilidad.

POR LO EXPUESTO:


Ruego a Ud. acceder a mi petición.

Puno, 11 de marzo del 2023

Atentamente,



Receibido
11-03-2023



FLORA QUISPE TICONA
DNI. N° 70238291



“año de la unidad, la paz y el desarrollo”

CARTA DE AUTORIZACIÓN

EL QUE SUSCRIBE, ENCARGADA DE LA JEFATURA DEL CENTRO DE SALUD
VALLECITO – PUNO

Es grato dirigirme a usted, Srta. **FLORA QUISPE TICONA** identificado con D.N.I N° **70238291**, Bachiller en Enfermería, En calidad de encargada de la jefatura del centro de salud vallecito I-3, autorizo a la señorita para que ejecute su proyecto de tesis titulado, **FACTORES ASOCIADOS EN EL ABANDONO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES DEL CENTRO DE SALUD VALLECITO I-3**. Al respecto, he dispuesto que los servidores del establecimiento de salud, a partir de la fecha le brinden las facilidades necesarias para la recolección de datos.

Puno, 7 de marzo del 2023

Atentamente



MINISTERIO DE SALUD
REGION PUNO
JEFATURA
VALLECITO
Srta. Nieves Flores Quijo
LIC. EN ENFERMERIA
CIP 2023

Lic. Ent. Nieves Flores Quijo
Encarga de la jefatura del establecimiento de salud vallecito

Anexo 06: Evidencias fotográficas

Fotografía N° 1.



Descripción: Centro de salud vallecito I-3, antes de dar inicio con la ejecución de tesis.

Categoría: Centro de salud I-3

Ciudad: Puno

Dirección: Jr. Cancharani N° 343 con Jr. Garnica

Fotografía N° 2



Descripción: En la imagen se evidencia investigadora presentándose y dando una breve introducción.

Categoría: Centro de salud I-3

Ciudad: Puno

Dirección: Jr. Cancharani N° 343 con Jr. Garnica

Fotografía N° 3



Descripción: En esta imagen se evidencia cuando se le hace firmar el consentimiento informado a la mujer en el centro de salud vallecito-I3.

Categoría: Centro de salud I-3

Ciudad: Puno

Dirección: Jr. Cancharani N° 343 con Jr. Garnica

Fotografía N° 4



Fotografía N° 5



Fotografía N° 6



Fotografía N° 7



Descripción: la investigadora realiza las encuestas a las mujeres del centro de salud vallecito 1-3.

Categoría: Centro de salud I-3

Ciudad: Puno

Dirección: Jr. Cancharani N° 343 con Jr. Garnica